

□ 站内搜索 □

请输入查询的字符串:

==> 综合查询 <==

jq 标题查询 jq 内容查询

查询

重写

2005年第1期

2005年第2期

2005年第3期

2005年第4期

2006年第1期

2006年第2期

2006年第3期

2006年第4期

2007年第1期

2007年第2期

2007年第3期

2007年第4期

2008年第1期

医学术语中常见语音误读举隅

发布时间: 2007-12-13 11:22:42 被阅览数: 202 次 来源: 《南方医学教育》 2007年第4期

文字 [大 中 小] € 自动滚屏 (右键暂停)

医学术语中常见语音误读举隅

吴芑¹, 刘来昱²

(南方医科大学第一附属医院 1泌尿外科, 2呼吸内科, 广州 510515)

医学教学过程中各类词语的错读与误读时有发生,大致可分为三类:(1)错读。由于长期的习惯及地方口音造成的误读,例如癫痫的“痫”字,正确读法应为xián,而不是jiān;潴留的“潴”应读为zhū,而非chū。(2)多音字。一个字本有多种读音,但在不同的词组和环境中有其独特的读法,如:咯血,淋病,寒颤等。“大”这个字,有dà和dài两种读音。“大夫(医生)”和“大黄”中的“大”都只能读dài。

(3)不按规范的读音:一些词语有其旧的读音或习惯性读法,但普通话审音委员会于1985年修订发布了《普通话异读词审音表》,着眼于普通话词语的一些异读现象审定读音,是目前法定的汉字读音标准,一些常用的旧读音已经改变,如便秘(mì),荨(xún)麻疹。这些读音的误读,虽不算绝对错误,但不合规范。

正确读音是对教师的基本要求,也是教师职业素养的反映。在医学教学过程中养成规范读音的好习惯,不仅能够树立严谨的教师风范,更重要的是使中国文字能按照它原有的涵义、本来的读音正确流传下来。现对易误读的医学专有名词举隅示之。

字词	误读音	正确读音
分娩	wǎn	miǎn
氯化钠	lù	lǜ
嵌顿	kān	qiàn
嘌呤	piāo líng	piào lìng
睾丸	gǎo	gāo
贲门	pēn	bēn
妊娠	chén	shēn
髌骨	qiǎ	qià
脊柱	jí	jì
干骺端	gòu	hóu
坏疽	zǔ	jū
便秘	bì	mì
脊髓	suí	suǐ

氨基贰	gān	dài
阴茎	jìng	jīng
潜伏期	qiǎn	qián
前臂	bèi	bì
肱骨	hóng	gōng
骸骨	bīn	bìn
腓骨	fēi	féi
蹠骨	zhè	zhí
骰骨	shǎi	tóu
冠心病	guàn	guān
内上髁	kè	kē
纤维囊	qiān	xiān
系带	xì	jì
阴阜	bù	fù
岬	jiá	jiǎ
奇静脉	qí	jī
棘突	jī	jí
肋骨	lè	lèi
味蕾	léi	lěi
髌白	jiū	jiù
毗邻	bǐ	pí
憩室	qì	xī
镫骨	dēng	dèng
畸形	qí	jī
咯血	ké	kā
耳廓	guō	kuò
鼻衄	niù	nù
纤维	qiān	xiān
楔骨	qì	xiē
桡骨	náo	ráo
脂肪	zhī	zhī
内眦	cì	zì
膝盖	qī	xī
霰粒肿	sàn	xiàn
涎	yán	xián
咀嚼	zǔ	jǔ
眼睑	liǎn	jiǎn
浸润	qīn	jìn
痤疮	zuò	cuó
搯	xù nì	chù nuò
卒中	cù	zú
猝死	zú	cù
子痫	jiān	xián
淋病	lín	lìn
寒颤	chàn	zhàn
房颤	zhàn	chàn
潴留	chǔ	zhū

濒死	pín	bīn
龋齿	yù	qǔ
膏肓	máng	huāng
绦虫	tiáo	tāo
干酪	luò	lào
吮吮	yǔn	shǔn
创伤	chuàng	chuāng
大黄	dà	dài
秦艽	jiǔ	jiāo

上两条同类新闻:

- [教书育人 毕生不怠 ——记南方医院临床医学系主任孙大成教授](#)

 推荐给朋友 |  打包发回信箱 |  打印本页 |  关闭窗口