

Parallel talk

Latest results from GRAAL collaboration

V. Vegna<sup>1,2</sup>, V. Bellini<sup>3,4</sup>, J.P. Bouquet<sup>5</sup>, L. Casano<sup>2</sup>, A. D'Angelo<sup>1,2</sup>, J.P. Didelez<sup>6</sup>

1 Dip. di Fisica, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", via della Ricerca Scientifica 1, I-00133 Roma, Italy

2 INFN - Sezione di Roma "Tor Vergata", via della Ricerca Scientifica 1, I-00133 Roma, Italy

3 Dip. di Fisica e Astronomia, Università di Catania, via Santa Sofia 44, I-95123 Catania, Italy

4 INFN - Sezione di Catania, via Santa Sofia 44, I-95123 Catania, Italy

5 LPSC, Université Joseph Fourier Grenoble 1, CNRS/IN2P3, Institut National Polytechnique de Grenoble, 53 Avenue des Martyres, 38026 Grenoble, France

6 IPNO, Université de Paris-Sud 11, CNRS/IN2P3, 15 rue Georges Clemenceau, 91406 Orsay, France

7 Dip. di Fisica Sperimentale, Università di Torino, via P.Giuria, I-00125 Torino, Italy

8 INFN - Sezione di Torino, via P.Giuria, I-00125 Torino, Italy

9 Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena 299, I-00161 Roma, Italy

10 INFN - Sezione di Roma, piazzale Aldo Moro 2, I-00185 Roma, Italy

11 Dip. di Fisica, Università di Messina, salita Sperone 31, I-98166 Messina, Italy

12 Institute for Nuclear Research, RAS, 117312 Moscow, Russia)

13 INFN - Laboratori Nazionali di Frascati, via E.Fermi 40, I-00044 Frascati, Italy

收稿日期 2009-8-7 修回日期 网络版发布日期 2009-11-11 接受日期 2009-11-11

**摘要** The GRAAL experimental set-up consists of a polarized and tagged photon beam that covers an energy range from a minimum of 600 MeV up to a maximum of 1500 MeV, of a liquid Hydrogen or Deuterium target and of the 4n Lagrange detector optimized for photon detection. It allows the study of pseudo-scalar and vector meson photoproduction on the nucleon in the energy range corresponding to the second and the third resonance regions. In the following, the  $\Sigma$  beam asymmetries in  $\eta$  and  $\pi^0$  photoproduction on quasi-free nucleon are shown. Also single and double polarization observables in  $K+\Lambda$  photoproduction on free proton are shown; they are important to confirm the role of new or poorly known resonances in the 1900 MeV mass region.

**关键词** [polarized photon, meson photoproduction, polarization observables](#)

分类号

**DOI:**

通讯作者:

V. Vegna [vegna@roma2.infn.it](mailto:vegna@roma2.infn.it)

作者个人主页:

V. Vegna<sup>1,2</sup>; V. Bellini<sup>3,4</sup>; J.P. Bouquet<sup>5</sup>; L. Casano<sup>2</sup>; A. D'Angelo<sup>1,2</sup>; J.P. Didelez<sup>6</sup>

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#)(1840KB)

▶ [\[HTML全文\]](#)(0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“polarized photon, meson photoproduction, polarization observables”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [V Vegna](#)

· [V Bellini](#)

· [JP Bouquet](#)

· [L Casano](#)

· [A DAngelo](#)

· [JP Didelez](#)