



昆明植物园

当前位置: 首页 > 物种保护 > 花期物语 > 一月

花期物语

- > 一月
- > 二月
- > 三月
- > 四月
- > 五月
- > 六月
- > 七月
- > 八月
- > 九月
- > 十月
- > 十一月
- > 十二月

一月

烂漫冬樱花——高盆樱桃

文章来源:昆明植物园 | 发布时间: 2022-01-06 | 作者:陈智发 | 浏览次数: | 【打印】 【关闭】

高盆樱桃*Cerasus cerasoides* (D. Don) Sok.

蔷薇科Rosaceae 樱属*Cerasus*

俗名: 冬樱花、云南早樱、云南樱花、西府海棠、云南欧李、箐樱桃、苦樱桃、滇樱花、红花高盆樱桃。



产地: 又名云南樱桃, 箐樱桃(云南)、云南欧李, 又因个别变型于11月-2月间的冬春季开花, 又称为冬樱花, 云南省重点保护野生植物。产云南、西藏南部, 生于海拔1300-2200m沟谷密林中。克什米尔地区、尼泊尔、锡金、不丹、缅甸北部也有分布。果实可食, 云南个别地区作郁李仁代用品。在植物园内有小片冬樱花, 12月开放, 极为灿烂。

特征: 小乔木, 高可达15米; 枝幼时绿色, 被短柔毛, 不久脱落; 老枝灰黑色。叶片卵状披针形或长圆披针形, 叶边有锯齿。花1-3, 伞形排列, 与叶同时开放; 萼筒钟状, 常红色; 萼片三角形, 常带红色; 花瓣卵圆形, 先端圆钝或微凹, 淡粉色至白色; 雄蕊32-34, 短于花瓣; 花柱与雄蕊等长, 无毛, 柱头盘状。核果圆卵形, 长12-15mm, 熟时紫黑色; 核圆卵形, 顶端圆钝, 边有深沟和孔穴。

变种: 红花高盆樱桃*Cerasus cerasoides* var. *rubea*

产地: 产云南海拔1500-2000米林间、沟谷和开阔山坡, 尼泊尔、不丹、缅甸也有分布。本种在昆明为常见栽培, 花粉红色, 近半重瓣, 垂枝累累颇似北方的红色海棠花, 因有西府海棠之称, 可视为本变种的园艺品种, 在植物园多有栽培, 3月间开花满枝头, 极为灿烂。

特征: 高大乔木, 可达30米, 叶片长圆卵形至长圆倒卵形, 叶边有单锯齿或重锯齿, 下面中肋和细脉有长柔毛, 花先叶开, 伞形总状花序, 有短总花梗, 花2-4朵, 萼筒宽钟状, 深红色, 萼片三角形, 深红色; 花瓣倒卵形, 先端全缘或微凹, 深粉红色。花期2-3月。

现代研究已将此两种合并为高盆樱桃*Prunus cerasoides*, 并将樱属整体划为李属*Prunus*。

图文: 陈智发

编辑: 陈智发