



植物生态学报 » 2013, Vol. 37 » Issue (12): 1114-1122 DOI: 10.3724/SP.J.1258.2013.00114

研究论文

最新目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

◀◀ 前一篇 | 后一篇 ▶▶

## 3, 4-二羟基苯乙酮胁迫对天山云杉种子萌发过程中内源植物激素含量变化的影响

陈志颖<sup>1,2</sup>, 阮晓<sup>2</sup>, 张玉竹<sup>1,2</sup>, 潘存德<sup>1</sup>, 王强<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>新疆农业大学林学与园艺学院, 乌鲁木齐 830052;

<sup>2</sup>浙江大学宁波理工学院生物与化学工程学院, 浙江宁波 315100

Effects of 3,4-dihydroxy acetophenone stress on changes in the content of endogenous plant hormones during seed germination in *Picea schrenkiana* ssp. *tianschanica*

CHEN Zhi-Ying<sup>1,2</sup>, RUAN Xiao<sup>2</sup>, ZHANG Yu-Zhu<sup>1,2</sup>, PAN Cun-De<sup>1</sup>, and WANG Qiang<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>College of Forestry and Horticulture, Xinjiang Agricultural University, Ürümqi 830052, China;

<sup>2</sup>School of Biotechnology and Chemical Engineering, Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University, Ningbo, Zhejiang 315100, China

摘要

图/表

参考文献

相关文章

点击分布统计

下载分布统计

?

版权所有 © 2010 《植物生态学报》编辑部

地址: 北京香山南辛村20号, 邮编: 100093

Tel.: 010-62836134, 62836138; Fax: 010-82599431; E-mail: apes@ibcas.ac.cn, apesbotany@163.com