

[首 页](#)[关于本刊](#)[本刊公告](#)[下期预告](#)[投稿须知](#)[刊物订阅](#)[本刊编委](#)[编读往来](#)[联系我们](#)[English](#)

: 论文摘要 :

[返回](#)

昆虫学报, undefined 年, undefined 月, 第 undefined 卷, 第 undefined 期,
undefined - undefined 页

题目: 中国秽蝇属虎秽蝇种团(双翅目: 蝇科)分类研究

作者: 薛万琦* 佟艳丰

沈阳师范大学昆虫研究所, 沈阳 110034

摘要: 虎秽蝇种团隶属于双翅目蝇科的秽蝇属, 全世界已记录有7种。本文对我国虎秽蝇种团进行了整理, 总结我国该种团共8种(亚种), 编制了分种检索表, 并对其中的1新种和2新亚种分别予以记述, 即: (1) 白瓣秽蝇, 新种 *Coenosia albisquama* sp. nov., 该新种近似 *C. breviaedeagus* Wu et Xue, 1996, 但间额黑色无粉被, 侧颜宽约为触角第三节宽1/3 (后者为2/3), 小盾片背面灰色, 仅后端缘棕色, 中股前腹鬃较短, 近端后背鬃1, 腹部侧斑近三角形等可相区别。(2) 褐瘦弱秽蝇, 新亚种 *Coenosia attenuata brunnea* ssp. nov., 本新亚种与其指名亚种瘦弱秽蝇 *C. attenuata* Stein, 1903, 雄性尾器大体相同, 但以下方面区别明显: 额、颜、侧颜和颊的粉被为棕褐色(不为灰白色), 额狭于头宽的1/3, 额三角达额上方的1/3 (不在下方1/3), 触角和下颚须黑褐色(不为完全黄色); 胸部粉被褐色(不为灰色), 盾片具3黑条, 分别在中鬃和背中鬃列上(指名亚种无), 腋瓣淡棕色; 各足的基节、转节、股节和胫节的基半部为黑褐色(不为黄色), 后股具短小的前腹鬃列; 腹部粉被均暗褐色(不为灰色)。(3) 版纳秽蝇, 新亚种 *Coenosia strigipes bannaensis* ssp. nov., 该新亚种与主要分布于古北区的指名亚种毛足秽蝇 *C. strigipes* Stein, 1916 区别在于: 雄性和雌性的额三角前端达额中部, 侧颜较狭; 触角第三节完全黄色; 各足股节较细, 中、后股节腹面无细长毛, 后足胫节较直, 各足跗节约等于胫节长; 第1+2合背板具1对侧斑, 第一腹板裸等。模式标本保存在沈阳师范大学昆虫研究所。

关键词: 双翅目; 蝇科; 秽蝇属; 种团; 新种; 中国

通讯作者: 薛万琦 (E-mail: xwqfly@sina.com).

这篇文章摘要已经被浏览 46 次, 全文被下载 67 次。

[下载PDF文件 \(292101 字节\)](#)

您是第: **348389** 位访问者

《昆虫学报》编辑部

地 址: 北京北四环西路25号, 中国科学院动物研究所

邮 编: 100080

电 话: 010-82872092

传 真: 010-62569682

E-mail: kxcb@ioz.ac.cn

网 址: <http://www.insect.org.cn>