

广东汉族人TNF多态性 Genetic Polymorphism of TNF in the Han of Guangdong

陈盛强1, 刘利东2, 邓维意1, 陈柏铭2 CHEN Sheng-qiang1, LIU Li-dong2, DENG Wei-yi1, CHEN Bai-ming2

1.广州医学院第二附属医院神经科学研究所; 2.广州医学院检验系广州 510182 1.Neuroscience Research Insititu,Guangzhou Medical College,Guangzhou 510182,China; 2.Department of Larboratory,Guangzhou Medical College,Gnangzhou,510182,China

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 采用PCR-RFLP技术对103例广东汉族人TNF多态性进行了检测, 结果是:TNF β *1纯合子表型频率为0.2524, TNF β *2纯合子表型频率为0.2913, TNF β *1/TNF β *2杂合子表型频率为0.4563, TNF β *1基因频率0.4806, TNF β *1基因频率0.5194. 本结果与其他人群的结果进行了比较。

Abstract:The sample of 103 Guangdong Han people were determined for TNF by PCR-RFLP method, The results are as follows:genotype frequency:TNF β * 1/*1 0.2524, TNF β * 2/*2 0.2913, TNF β * 1/* 2 0.4563, Genefrequency:TNF β * 1 0.4806, TNF β * 2 0.5194. The results of this investigation were compared with that of others population.

关键词 [广东汉族人](#) [TNF多态性](#) [Key words](#) [Guangdong Han population](#) [TNF](#) [polymorphism](#)

分类号

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(0KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [复制索引](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“广东汉族人”的相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

- [陈盛强](#)
- [刘利东](#)
- [邓维意](#)
- [陈柏铭CHEN Sheng-qiang](#)
- [LIU Li-dong](#)
- [DENG Wei-yi](#)
- [CHEN Bai-ming](#)

Abstract

Key words

DOI:

通讯作者