

无栏目

NIRS定量分析油菜种子含油量、蛋白质含量数学模型的创建

甘莉 华中农业大学作物遗传改良国家重点

甘莉 华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室 武汉430070

孙秀丽 华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室 武汉430070

金良 华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室 武汉430070

王高全 华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室 武汉430070

徐久伟 华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室 武汉430070

魏泽兰 华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室 武汉430070

傅廷栋 华中农业大学作物遗传改良国

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 用近红外光谱 (NIRS)分析油菜品质。采用残余法测试了近 2 116份甘蓝型油菜品种资源种子的含油量,用近红外仪采集数据,选择 12 88份代表性样品,建立了数学模型。用该模型测试 96份待测样品,其NIRS的测试值与残余法测试的油菜种子含油量实测值相关系数为 0.950 3,相对误差小于 3.5%,用凯氏定氮法测试了 63 7份油菜籽饼粕的蛋白质含量,选择 168份代表性样品,建立数学模型。3 0份样品检测模型,NIRS测试值与凯氏定氮法测试的油菜籽饼粕蛋白质含量的实测值相关系数为

关键词 [甘蓝型油菜](#) [近红外光谱](#) [数学模型](#) [含油量](#) [蛋白质含量](#)

分类号 [1613](#)

DOI:

通讯作者:

作者个人主页: 甘莉 华中农业大学作物遗传改良国家重点

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(226KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中包含“甘蓝型油菜”的相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

· [甘莉 华中农业大学作物遗传改良国家重点](#)