

十堰市农业科学院 丹江口库区十堰生态农业研究院 十堰市农业科学技术研究推广中心

[首页](#)[单位概况](#)[科学研究](#)[推广服务](#)[党建之窗](#)[人才队伍](#)[专题专栏](#)当前位置：[首页](#) > [推广服务](#) > [科普园地](#)

十堰市茶叶11月份农事生产技术

来源：[市经作所](#) 发布时间：2023-10-25 14 发布者：[A+](#) [A-](#) [A](#) [A](#)

11月即将迎来立冬和小雪节气，天气渐冷，应及时开展封园消毒、防寒越冬、茶园设备清洁检修等工作。具体管理技术要点如下：

一、封园消毒

茶园冬季封园是茶园冬季管理的组成部分。主要目的是降低茶越冬害虫，如螨类、蚧类、小绿叶蝉、黑刺粉虱等害虫的虫口密度，减少茶炭疽病、茶饼病、茶煤病等病害的病菌基数。根据十堰茶区气候变化，一般在11月上旬至12月上旬期间，温度低于10℃时，使用0.5波美度石硫合剂封园。

使用石硫合剂封园时，用水量一定要足，喷施部位一定要到位。喷施时，一定要将茶树蓬面叶片、侧面叶片、茶树枝条、茶树地面以及地面上可能隐藏病虫害的枯枝落叶和土壤表面均应喷匀喷透。喷施时应注意在晴天进行封园作业，如果喷施后24小时内下雨，要重新喷药。石硫合剂呈碱性，具有腐蚀性和强烈的臭鸡蛋气味，在配药及施药时应戴口罩和穿保护性衣服，不要顺风喷施，以免对眼、鼻造成刺激，且不能与其他农药混用，以免造成药效损失。

二、防寒越冬

秋末冬初在茶树行间秸秆覆盖是一项应用比较普遍的技术。茶树行间覆盖可用农作物秸秆、锯末、厩肥、谷壳等，覆盖时间以“立冬”前后为宜。松土后覆盖，厚度以10-15cm为宜。

入冬前，及时将茶苗未木质化的嫩梢摘除或剪除，预防冬季冻害。

因鄂茶10号品种直立性较强、顶端优势特别明显，需要特别注意树体修剪管理工作。入冬前，及时将该品种茶苗未木质化的嫩梢摘除或剪除。3-4龄鄂茶10号茶苗可在第二年春季打顶采摘后再定型修剪，同时注意将中心主干尽量截短，做到“短截中心，长放侧枝”，增加茶树分枝量。或入冬前在茶园距地面45-50cm处进行定型修剪，同时将中心主干在离地35-40cm分枝处二次短截，注意一定要保留3-5个健壮侧枝。

三、其他管理措施

11月茶园生产季结束后，开始清理茶园道路、疏通排蓄水系统、打扫茶厂卫生、清洁和检修保养茶机。（曹语 张小福）

[【打印/关闭】](#)