

【作者】	石和芹, 汪荣灶, 熊春梅
【单位】	江西生物科技职业学院, 江西南昌
【卷号】	36
【发表年份】	2008
【发表刊期】	23
【发表页码】	10039-10040
【关键字】	茶芽粗腿象; 食叶量; 防治指标
【摘要】	<p>[目的] 明确茶芽粗腿象的防治适期和防治指标。[方法] 通过对成虫出土进度、死亡进度及食叶量进行研究, 提出其防治适期和防治指标。</p> <p>[结果] 茶芽粗腿象羽化出土时间前后约20 d, 在江西婺源始见期为4月初, 始盛期为4月上旬末, 盛期为4月中旬, 盛末期为4月中旬末, 末期为4月下旬。茶芽粗腿象成虫的为害期与春茶期吻合, 成虫室内取食量大的时期与田间发生为害盛期也是一致的。其成虫的食叶量和寿命个体间差异较大。成虫食叶量平均为202.9 mm<sup>2</sup>/头。根据该虫食叶量和被害鲜叶的价值, 该虫的防治指标定为900头/hm<sup>2</sup>。[结论] 为有效防治茶芽粗腿象提供参考。</p>
【附件】	 PDF下载 <a href="#">PDF阅读器下载</a>

关闭