

花木

如何使栀子花多开花?

来源: 惠农网

发布时间: 2024-05-07 10:25:33

分享

栀子花又名山栀子、黄栀子、白蟪花等,为常绿灌木或小乔木。栀子花香芬芳,花瓣晶莹如玉,具有很高的观赏价值。一般在5月-6月开花,花期可延至7月-8月,单花开放5天-8天左右。栽植栀子花如果管理到位,可促其大量开花。



施肥保水。栀子花适宜酸性土壤,培养土应以微酸性的沙壤土7成、腐叶质土3成混合而成,将土壤PH值控制在4.0-6.5之间为宜。栀子虽不是十分喜肥的花卉,但因开花期长,生长旺盛,所以需要合理补充肥料,一般每10天左右施1次腐熟的有机肥,施肥前1天停止浇水,施肥后浇1次透水。夏秋干旱季节,可结合浇水,追施速效磷氮肥,可使叶色常绿,花叶皆美。入秋后,少施或不施肥,故有“施肥不过秋”之说。当叶片发黄时可用1%硫酸亚铁矾肥水浇盆,使叶色转为亮绿色。栀子花喜欢空气湿润,生长期要适量增加浇水,当盆土发白时即可浇水,盛夏和早秋可每天白天向叶面喷水2-3次,但现花蕾后浇水不宜过大,防止大水烂根。

合理摘心。新枝长出3节以后摘心,促进分枝萌生。为了防止此3节上的侧芽合部萌发而导致树冠过于稠密,应将基部侧芽抹掉1-2个,留下1-2个抽生二次枝。8月份,再对二次枝进行摘心,阻止其继续生长。此次摘心后,不要再抹芽,让腋芽充分发育,来年春季这些侧芽可抽枝开花。

控制落苞。3月-4月花苞孕育期间,要求空气湿度大、土壤湿润而不积水,还要保持空气流通,以防落苞掉叶。春寒时,要采取措施防寒风侵袭,否则花苞发育会中断。此时,土壤还要保持偏酸的状态,以防生理性黄化落苞。

整形修剪。栀子花喜充足的光照,特别在春、秋两季,每日要多于8个小时的日照,但夏季忌中午强光暴晒,花盆最好置于散光处(透光率40%-50%为宜)。栀子花萌发力强,整形时可选留3-5根主枝,将主枝基部20厘米处萌发出来的侧枝全部剪掉,让侧枝从主枝的中部以上萌生,并随时剪掉茎上萌发出来的根孽条。从6月中旬开始,对花谢后的枝条及时短截,然后将开花后的花枝保留基部2-3节后剪掉,促使基部侧芽萌发而抽生新枝。

转载请注明“来源”:四川农村信息网



相关信息



水培铜钱草要怎么养?

水培铜钱草可以直接买现成的回家养,也可以买点种子自己回家种,还可以从朋友家或者别的地方挖点根自己培育。大多数人都会选择直接买现成的回家养,下面来说说买的现成水培铜钱草需要注...

花卉网

2024-05-14 11:02:21



蜀葵的养护方法

蜀葵,也叫大蜀季、戎葵,是多年生草本,花多为红色,故名“一丈红”。蜀葵的花期为6月至8月,开花后观赏价值较高,受到很多花友们的喜爱。

农资招商网

2024-05-13 10:04:43



空气鳳梨怎么种?

空气鳳梨是非常好看的观赏植物,外观独特新奇,而且生长过程中完全不需要土壤,在空气中就能够生长。种植方法简单,那么它怎么种呢?

花百科

2024-05-11 09:51:56



铃兰休眠期需注意哪些要点?

铃兰这种花卉的观赏价值很高,吸引了不少人养殖,在管理方面需要多加注意才能开花。那到了铃兰的休眠期需注意哪些要点呢?

农资招商网

2024-05-10 11:03:01



香雪兰怎么防倒伏?

香雪兰开花非常的香,花色鲜艳迷人,非常的漂亮,但香雪兰养护过程中容易发生倒伏问题,那么香雪兰怎么防倒伏?

惠农网

2024-05-09 09:47:11

Load more

