

麦田斑须蝽

学名 *Dolycoris baccarum*(Linnaeus)半翅目，蝽科。别名细毛蝽、臭大姐。分布在全国各地。

寄主 小麦、大麦、粟(谷子)、玉米、白菜、油菜、甘蓝、萝卜、豌豆、胡萝卜、、葱及其他农作物。

为害特点 成虫和若虫刺吸嫩叶、嫩茎及穗部汁液。茎叶被害后，出现黄褐色斑点，严重时叶片卷曲，嫩茎凋萎，影响生长，减产减收。



形态特征 成虫体长8—13.5mm，宽约6mm，椭圆形，黄褐或紫色，密被白绒毛和黑色小刻点；触角黑白相间；喙细长，紧贴于头部腹面。小盾片末端钝而光滑，黄白色。(图右)

生活习性 内蒙古一年2代，以成虫在田间杂草、枯枝落叶、植物根际、树皮及屋檐下越冬。4月初开始活动，4月中旬交尾产卵，4月底5月初幼虫孵化，第一代成虫6月初羽化，6月中旬为产卵盛期；第二代于6月中下旬7月上旬幼虫孵化，8月中旬开始羽化为成虫，10

月上中旬陆续越冬。卵多产在作物上部叶片正面或花蕾、果实的苞片上，多行整齐纵列。初孵若虫群聚为害，2龄后扩散为害。

防治方法 参见[二星蝽](#)。