

## 中药材

### 太子参除草剂的使用方法

来源：耕种帮种植网

发布时间：2024-07-10 10:03:51

分享

太子参是一种常见的中药材，有补气生津的作用，常用于脾胃虚弱、倦怠乏力、食欲不振等症。其市场需求旺盛。防治时期是冬前11月中旬-12月上旬（11月10日-12月15日）；补治时期是春节后太子参返青期（3月10日-25日）。



太子参除草剂使用方法：

太子参的幼苗细弱，生长缓慢，应及时除草，做到见草就拔，促进参苗快速生长。若面积大，杂草多，采用化学除草较省工。具体做法是栽后选晴天（注意避开中午强光高温时期），用丁草胺20~50g对水50kg对地面杂草进行喷雾，或用6%的草甘磷稀释200倍液喷洒，均可消灭防止多种杂草。

- 1、在播前或播后出苗前时，对于田中已有杂草，可选用41%草甘磷 200ml/亩或20%百草枯200ml/亩，进行地面喷雾。注意：如果是播后出苗前使用灭生性除草剂，一定要在播后2~3天内使用。
- 2、在播后苗前进行土壤封闭处理，可选用50%乙草胺250ml/亩或90%乙草胺100ml/亩，或960克/升异丙甲草胺60~90ml/亩做土壤处理，可防除多种一年生禾本科杂草。需要注意的是排水问题，尤其是使用乙草胺做封闭处理时，如遇降雨或低洼易涝地块，乙草胺易产生药害，异丙甲草胺相对要。
- 3、在苗后进行茎叶处理时，80%太子参幼苗出土时，可用小锄人工浅锄一次，春季出苗齐后，可用氟吡甲禾灵（盖草能）30~40ml/亩除草，可防除多种一年生禾本科杂草，到苗后期植株封行后，建议人工防除，停止化学防除。

转载请注明“来源”：四川农村信息网



## 相关信息



### 种植黄精的施肥方法

黄精生长期长，一年至少需要施肥2次，分别为生长期和开花期。具体的施肥时间视当地气候和土壤情况而定，一般在春季和秋季进行施肥。

农资招商网

2024-07-26 10:24:48



### 麦冬怎么种植产量才高？

麦冬又叫做沿阶草、麦门冬，是百合科多年生草本植物麦冬的块根，具有不错的药用价值，很多地区有栽种。那么麦冬怎么种植产量才高？

农资招商网

2024-07-24 10:37:58



### 大棚栽培金线莲要点

栽培基地应选择生态条件良好、水源清洁、排水良好、立地开阔、通风良好的地块，要求周围5公里内无工业厂矿、无“三废”污染、无垃圾场等其他污染源，并距离交通主干道500m以外的生产区...

耕种帮种植网

2024-07-23 11:01:45



### 厚朴的播种繁殖方法

厚朴可以采用压条和种子繁殖，以种子繁殖为主。现将种子繁殖方法介绍如下：

耕种帮种植网

2024-07-22 09:48:44



### 中草药三叶青怎么种植？

三叶青的块茎或全株可入药，是民间常用的中草药之一，可用于抗病毒、抗炎、镇痛解热、活血化瘀，其毒副作用小，被称为“植物抗生素”。

耕种帮种植网

2024-07-18 10:35:43

Load more

