



# 廊坊市农林科学院

LANGFANG ACADEMY OF AGRICULTURAL AND FORESTRY SCIENCES

## 服务“三农” 助力发展

[首页](#)
[单位简介](#)
[新闻资讯](#)
[工作进展](#)
[农时技术](#)
[专题视频](#)
[食品安全](#)
[科技成果](#)
[专家答疑](#)

当前位置：首页 / 科技成果 / 论文发表

## 如何防治肉鸽啄癖

王学迁 2913 阅读 2022-06-15 发布时间

饲养的肉鸽，有时会发生啄羽、啄肛等不良行为。养殖上称这种行为为啄癖。如何防治肉鸽的啄癖呢？针对啄癖发生的实际情况，要注意做好以下几点：

1. 管理人员要定时给料给水、防止过饥过饱、合理饲养密度、保持舍内良好通风和适宜温湿度。
2. 对不做种用的肉鸽实行一次或多次断喙技术。发现有啄癖的要尽早隔离。
3. 防止强光长时间照射，鸽子舍内避免用黄色或青光照明，应采用40瓦红色或蓝色或蓝绿光灯泡照明。
4. 提高日粮蛋白质质量和补加含硫氨基酸。发生缺盐引起的啄癖时，在1天至2天内饲料中加2%~4%食盐并充足饮水，而后迅速降为0.5%食盐以治疗。治疗缺硫引起的啄癖时，连续3天，在饲料中加入1%硫酸钠，见效后改为0.1%常规用量。而在蛋鸽子日粮中加入0.4%至0.6%硫酸钠对治疗和预防啄肛有效。在饲料中加入1.5%~2.0%石膏粉治疗原因不清之啄羽症。



### 热门文章

- 1 苏丹草栽培技术要点
- 2 肉鹅林下高效生态养殖技术
- 3 蛋鸡夏季养殖要点及饲养管理措施
- 4 紫花苜蓿及栽培管理要点
- 5 金银花生产中生物有机肥施用技术
- 6 如何防治肉鸽啄癖
- 7 夏季猪场消灭苍蝇的方法
- 8 三花鹅育雏期添加菊芋全粉对采食...
- 9 冬牧70黑麦草
- 10 解淀粉芽孢杆菌7 T 6的分离鉴定...

