



## 夏季养羊管理要点

▲ 路国强 ● 6815 阅读 ○ 2022-06-15 发布时间

养羊在我国各地都有着非常大的养殖规模，羊的养殖方向有羊毛、羊肉等，其市场需求都非常大。在养羊的时候，每个季节都有着不同的管理方法。尤其是进入夏季之后，温度升高，对羊的生长是非常不利的。那么在夏季该怎么去养羊呢？下面就为大家介绍一下夏季养羊的管理要点。

### 1、适当剪毛

羊毛对羊来说在冬季是一种非常好的保暖工具，能够防止体温下降，避免消耗过多的热量。不过在夏季却会阻碍羊的散热，反而影响羊的生长。所以我们在进入夏季之前要对羊做好剪毛工作，根据养殖品种控制好剪羊毛的时间与方法。要剪除两侧体位的绒毛，不过要保留肚子上的，防止受凉。在剪完毛之后做好驱虫工作，然后进行药浴，在药浴前要保证羊饮水充足，防止羊口渴误喝药液导致中毒。

### 2、修整羊蹄

夏季的温度是非常高的，并且还容易出现高湿现象，所以羊极易出现腐蹄病等疾病。因此我们在进入夏季之前要适当修整羊蹄，来减少蹄部疾病的发病率。首先要将羊蹄泡软，然后让羊侧卧，固定住羊腿的飞节部位。防止羊乱动影响修整工作，首先要将羊蹄缝中杂质及各种腐烂物清除干净。然后去除一些多余的蹄质，不可修剪过度，防止出血。如果出现出血现象的话，要及时处理，防止伤口感染。修剪好的羊蹄要保证平整、规则。

### 3、温湿度控制

夏季极易出现高温高湿的环境，对羊的食欲与健康会造成较大的影响。因此我们在夏季来临之前要控制好羊舍内的温湿度，搭好遮阳棚，如果有树木等遮挡物的话，那么便可不用搭建。然后将羊舍涂刷成白色，利用白色的特性进行散热。保证羊舍内有良好的通透性，适时通风进行对流。有条件的可以安装排风扇、水帘等各种降温设施，为羊营造一个良好的生长环境。

### 4、饲养管理

#### （1）羊舍的管理

夏季气温高、湿度大，病毒细菌繁殖快，羊舍应做好防暑降温工作，每天打扫羊舍，保持环境卫生，通风干燥，每天至少清理粪便2~3次，并做好消灭蚊蝇工作，羊舍要设置遮阳棚，这样可以给羊群一个清凉舒适的休息场所。羊舍周边的杂草要尽量割除，排除积水，减少蚊虫滋生。另外羊舍还要定期消毒，消灭传染源散播于外界环境中的病原微生物，切断传播途径，阻止疫病继续蔓延。每个羊舍都应建立切实可行的消毒制度，定期对羊舍地面土壤、粪便、污水、皮毛等进行消毒。整个羊舍可用2%~4%氢氧化钠消毒或用1:1800~1:3000的百毒杀带羊消毒，消毒药需要交替使用。

#### （2）饲喂技术

由于气候炎热，羊的采食量普遍下降，应采取多次饲喂的方法，并给羊群选用适口性好，营养价值高的牧草，再补饲适量精料，这样可以增强羊的体质，对高温环境有一定抵抗能力。如果夜间实行补饲，补饲时间宜为晚间10点左右，过晚不利于羊只休息与消化。还要保持羊群有充足清洁的饮水，能让羊只自由饮用，同时按每千克羊体重添加0.2g食盐，每只羊补充5~9g食盐，调节羊只体内酸碱平衡。

进入夏季之后我们还要适当调整饲喂量及方法，以提高羊的进食量与消化为目的。羊在夏季的进食量通常都会下降，主要是因为温湿度的原因。尤其是在白天的时候，如果温度过高的话，那么羊可能会拒绝进食。因此为了保证羊的食欲，我们要将饲喂时间调整至早晚不热的时候，提高青饲的比例。既能够提高适口性，又能够增强羊的抗应激能力。

#### （3）合理放牧

夏季是牧草生长的旺季，但气候炎热，放牧要坚持早出晚归的原则，禁止午间放牧，以防阳光直射羊群发生中暑，早上放牧时间不能过早，要待牧草上的露水干透，才能放牧，防止羊群吃到沾有露水的牧草，发生口疮。在上午9时到10时以前，羊群必须归圈休息；下午6点钟以后再外出放牧。放牧时也不要选择低洼有积水的地带，以防止寄生虫感染。

#### 5、防疫驱虫

加强疫病防治，一旦暴发传染病会给养殖户带来巨大的经济损失，必须坚持预防为主方针，制定科学合理的疫病免疫程序是必要的，根据程序进行免疫注射口蹄疫、羊三联四防、羊痘、羊传染性胸膜肺炎等疫苗，刺激机体产生免疫抗体，同时做好免疫记录。

定期驱虫。夏季蚊虫较多，放牧时羊只也可能吃到沾有虫卵的牧草，所以应给羊群定期驱除体内外寄生虫，丙硫咪唑、阿维菌素或伊维菌素都是具有高效、低毒、广谱特点的驱虫药，可以交替使用，以驱除体内外寄生虫。

### 热门文章

- 1 苏丹草栽培技术要点
- 2 肉鹅林下高效生态养殖技术
- 3 蛋鸡夏季养殖要点及饲养管理措施
- 4 紫花苜蓿及栽培管理要点
- 5 金银花生产中生物有机肥施用技术
- 6 如何防治肉鸽啄癖
- 7 夏季猪场消灭苍蝇的方法
- 8 三花鹅育雏期添加菊芋全粉对采食...
- 9 冬牧70黑麦草
- 10 解淀粉芽孢杆菌7 T 6 的分离鉴定...

