



畜牧兽医学报 » 2005, Vol. 36 » Issue (12): 1292-1299 DOI:

[畜牧](#)[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)[« 前一篇](#) | [后一篇 »](#)

### 不同NDF/NFC比的日粮对山羊小肠可吸收氨基酸组成的影响

赵国琦;贾亚红;陈小连;孙龙生;赵健亚;周为琴;郭玉华;刘墨祥

扬州大学动物科学与技术学院, 扬州 225009

### Effect of NDF to NFC Ratios on Absorbable Amino Acids in the Small Intestine of the Goats

ZHAO Guo-qi; JIA Ya-hong; CHEN Xiao-lian; SUN Long-sheng; ZHAO Jian-ya, ZHOU Wei-qin; GUO Yu-hua; LIU Mo-xiang

College of Animal Science and Technology, Yangzhou University, Yangzhou 225009, China

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献](#)[相关文章 \(15\)](#)

京ICP备07023558号

版权所有 © 2008 《畜牧兽医学报》编辑部

地址: 北京市海淀区圆明园西路2号中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 邮政编码: 100193

Tel: 010-62815987 E-mail: xmsyxb@263.net