

论文

2003-2007年浙江省温州市居民死亡趋势及死亡负担分析

邵永强, 钱含笑, 陈祎, 张孝和, 张娜, 谢海滨

浙江省温州市疾病预防控制中心, 浙江温州325001

摘要:

目的分析浙江省温州市居民死亡水平、主要死亡原因及死亡负担变化趋势。方法按照ICD-10编码对温州市居民2003-2007年死亡资料进行分类整理, 计算出生率、死亡率、死因构成、潜在寿命损失年(YPLL)。用Death Reg_2002软件系统进行统计分析。结果温州市2003-2007年出生率、婴儿死亡率、死亡率、标化死亡率各为896.69/10万、510.06/10万、538.66/10万、424.27/10万。主要死因顺位为恶性肿瘤、脑血管疾病、呼吸系统疾病、心脏病、伤害和中毒, 前5位死因死亡数占总死亡数的78.41%。潜在寿命损失前8位分别为恶性肿瘤、伤害和中毒、脑血管疾病、心脏病、先天畸形、源于围生期疾病、呼吸系统疾病、传染病, 平均减寿率分别为1.26%、0.94%、0.23%、0.21%、0.17%、0.13%、0.08%、0.08%。结论慢性病和伤害为温州市居民的主要死因, 应加强肿瘤和伤害的预防控制工作。

关键词: 死因; 出生率; 死亡率; 潜在寿命损失年; 死因顺位

收稿日期 2008-05-23 修回日期 网络版发布日期

DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2009.03.024

基金项目:

通讯作者:

作者简介:

本刊中的类似文章

文章评论

反馈人	<input type="text"/>	邮箱地址	<input type="text"/>
反馈标题	<input type="text"/>	验证码	<input type="text"/> 0671

扩展功能

本文信息

- Supporting info
- PDF(940KB)
- [HTML全文](1KB)
- 参考文献[PDF]
- 参考文献

服务与反馈

- 把本文推荐给朋友
- 加入我的书架
- 加入引用管理器
- 引用本文
- Email Alert
- 文章反馈
- 浏览反馈信息

本文关键词相关文章

- 死因; 出生率; 死亡率; 潜在寿命损失年; 死因顺位

本文作者相关文章

PubMed