

论文

2004-2008年云南省不明原因猝死病区居民的全死因分析

徐昌¹, 陆步来¹, 龙江¹, 谢旭¹, 申涛¹, 施国庆¹, 杨林², 黄文丽², 张健³

1. 中国疾病预防控制中心中国现场流行病学培训项目, 北京100050; 2. 云南省地方病防治所; 3. 中国医学科学院阜外心血管病医院

摘要:

目的掌握2004-2008年云南不明原因猝死病区居民的全死因特征。方法将云南省不明原因猝死全死因监测乡镇的所有自然村分为猝死自然村组和对照自然村组, 对比分析两组的死亡率、死因谱和死亡季节特征。结果猝死自然村组粗死亡率为0.90%, 标化死亡率为0.69%; 对照自然村组粗死亡率为0.62%, 标化死亡率为0.48%。云南省猝死自然村组前5位死因顺位分别是呼吸系统疾病、循环系统疾病、损伤和中毒、不明原因猝死和肿瘤; 对照自然村组前5位死因顺位分别是循环系统疾病、呼吸系统疾病、损伤和中毒、肿瘤和消化系统疾病。猝死自然村组全年中死亡例数最多的3个月份分别是8、1和7月; 对照自然村组全年中死亡例数最多的3个月份分别是2、3和5月。结论2004-2008年云南省猝死自然村组死亡率高于对照自然村, 死因谱和死亡季节特征也不同。

关键词: 死因; 云南省不明原因猝死; 流行病学

收稿日期 2009-04-16 修回日期 网络版发布日期

DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2009.06.022

基金项目:

通讯作者:

作者简介:

本刊中的类似文章

文章评论

反馈人	<input type="text"/>	邮箱地址	<input type="text"/>
反馈标题	<input type="text"/>	验证码	<input type="text" value="5608"/>

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(961KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(1KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

- ▶ [死因; 云南省不明原因猝死; 流行病学](#)

本文作者相关文章

PubMed