

论文

2000-2008年广西宾阳县麻疹暴发疫情特征分析

庞秀然

广西宾阳县疾病预防控制中心, 广西宾阳530400

摘要:

目的分析2000-2008年广西宾阳县麻疹暴发疫情的流行病学特征。方法利用宾阳县2000年以来的传染病疫情统计资料、麻疹监测系统资料、麻疹暴发疫情处理资料,对麻疹暴发疫情特征进行描述流行病学分析。结果宾阳县2000-2008年共发生5起麻疹暴发,合计发病57例,占9年来全县麻疹发病总例数(267例)的21.35%;5起暴发涉及5个镇的3个自然村和2个私营工厂,平均罹患率36.82%,无死亡病例。麻疹暴发有明显的季节性,主要集中在4-7月;暴发病例以1~14岁病例为主占92.98%;92.98%的暴发病例无麻疹疫苗免疫史。本县人口暴发2起,发病36例,占暴发总数63.16%,外来人口暴发2起,发病16例,占暴发总数的28.07%,混合型暴发1起,发病5例,占暴发总数的8.77%。结论免疫规划薄弱村屯儿童、流动人口儿童常规免疫接种率低,疫情报告不及时是麻疹暴发的主要原因,应加强对这两个环节儿童的常规免疫和麻疹主动监测工作。

关键词: 麻疹; 暴发; 流行病学特征

收稿日期 2009-02-13 修回日期 网络版发布日期

DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2009.10.020

基金项目:

通讯作者:

作者简介:

本刊中的类似文章

文章评论

反馈人	<input type="text"/>	邮箱地址	<input type="text"/>
反馈标题	<input type="text"/>	验证码	<input type="text"/> 8966

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(924KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(1KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

- ▶ [麻疹; 暴发; 流行病学特征](#)

本文作者相关文章

PubMed