

药物与临床

健脾生血冲剂与硫酸亚铁治疗缺铁性贫血比较

戴琼

(武汉大学研究生院,武汉430072)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的: 比较健脾生血冲剂与硫酸亚铁冲剂对缺铁性贫血的疗效.方法: 选择缺铁性贫血患者429例,随机分为治疗组320例,口服健脾生血冲剂6个月~2岁,每次5 g;~4岁每次10 g;~6岁,每次15 g;>6岁,每次20 g;对照组109例,口服硫酸亚铁冲剂每次1.5~2 mg/kg,均每日2或3次,两组疗程均4周.结果: 健脾生血冲剂的总疗效高于硫酸亚铁冲剂($P<0.05$),症状缓解率高于硫酸亚铁冲剂($P<0.01$),副作用发生率低于硫酸亚铁冲剂($P<0.05$).D-木糖吸收试验证明,该冲剂能改善吸收功能.治疗后升高血红蛋白(Hb)、血清铁蛋白(SF),降低红细胞内游离血卟啉(FEP),两组差异均有显著性.结论: 健脾生血冲剂是一种疗效确切、无明显毒副作用的治疗缺铁性贫血的药物.

关键词 [健脾生血冲剂](#) [硫酸亚铁冲剂](#) [贫血,缺铁性](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004_0781\(2003\)01_0051_02](#)

通讯作者:

作者个人主页: [戴琼](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(957KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“健脾生血冲剂”的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [戴琼](#)