

姚倩东, 杨春, 郑敏文, 王虎, 赵宏亮, 杨光, 莫显斌, 张劲松. 双源CT诊断川崎病冠状动脉病变[J]. 中国医学影像技术, 2011, 27(1): 74-77

## 双源CT诊断川崎病冠状动脉病变

### Dual-source CT in diagnosis of Kawasaki disease with coronary arterial lesions

投稿时间: 9/12/2010 最后修改时间: 10/14/2010

DOI:

中文关键词: [体层摄影术](#) [X线计算机](#); [川崎病](#); [冠状动脉病变](#)

英文关键词: [Tomography](#) [X-ray computed](#); [Kawasaki disease](#); [Coronary arterial lesion](#)

基金项目:

作者	单位	E-mail
<a href="#">姚倩东</a>	<a href="#">四川省科学城医院放射科, 四川 绵阳 621900</a>	
<a href="#">杨春</a>	<a href="#">四川省科学城医院放射科, 四川 绵阳 621900</a>	
<a href="#">郑敏文</a>	<a href="#">第四军医大学西京医院放射科, 陕西 西安 710032</a>	<a href="mailto:zhengmw2007@yahoo.com.cn">zhengmw2007@yahoo.com.cn</a>
<a href="#">王虎</a>	<a href="#">四川省科学城医院放射科, 四川 绵阳 621900</a>	
<a href="#">赵宏亮</a>	<a href="#">第四军医大学西京医院放射科, 陕西 西安 710032</a>	
<a href="#">杨光</a>	<a href="#">四川省科学城医院放射科, 四川 绵阳 621900</a>	
<a href="#">莫显斌</a>	<a href="#">四川省科学城医院放射科, 四川 绵阳 621900</a>	
<a href="#">张劲松</a>	<a href="#">第四军医大学西京医院放射科, 陕西 西安 710032</a>	

摘要点击次数: 233

全文下载次数: 101

中文摘要:

**目的** 探讨双源CT(DSCT)诊断川崎病冠状动脉病变的临床应用价值。**方法** 对16例川崎病冠状动脉病变患者进行DSCT冠状动脉成像, 将获得的数据进行容积再现(VR)、多平面重建(MPR)、最大密度投影(MIP)、曲面重建(CPR), 观察冠状动脉病变的部位、数目、形态和大小, 并和同期超声心动图(ECHO) 进行比较分析。**结果** 16例川崎病患者共累及22支血管, 表现为单纯性冠状动脉扩张4例、单纯性冠状动脉狭窄2例、冠状动脉瘤10例(共28个), 其中2例冠状动脉瘤伴钙化、4例冠状动脉瘤伴冠状动脉扩张。ECHO未显示的病变为小冠状动脉瘤4个(右冠状动脉远段2个、左前降支远段及左回旋支中段各1个)、冠状动脉钙化2例、冠状动脉狭窄1例、冠状动脉轻度扩张1例。**结论** DSCT能清晰全面显示冠状动脉病变及程度, 是川崎病冠状动脉病变患儿诊断和随访的重要评估方法。

英文摘要:

**Objective** To observe the value of dual-source CT (DSCT) in diagnosis of Kawasaki disease (KD) with coronary arterial lesions (CAL). **Methods** Totally 16 patients with known KD with CAL were examined with DSCT. The source images were post processed using volume rendering (VR), multiple planar reformation (MPR), maximum intensity projection (MIP) and curved planar reformation (CPR). The location, number, shape and size of CAL were recorded and compared with those of echocardiography (ECHO) simultaneously. **Results** DSCT showed CAL in 16 patients involving 22 coronary arteries, including 4 patients with simple dilated coronary arteries, 2 with simple coronary arteries stenosis and 10 with 28 coronary arterial aneurysms. Two patients with aneurysm calcification and 4 patients with aneurysm dilatation were found. ECHO failed to detect 4 small aneurysms, including 2 located in the distal segments of the right coronary artery, 1 in distal segment of left anterior descending artery (LAD) and 1 in middle segment of left circumflex artery (LCX). Two patients with calcification, 1 with stenosis and 1 with dilatation of coronary artery were not found with ECHO also. **Conclusion** DSCT can be used to display the location and extent of CAL, having an important clinical significance in the diagnosis and prognosis of KD with CAL.

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

关闭

您是第1315174位访问者

版权所有: 《中国医学影像技术》编辑部

主管单位: 中国科学院 主办单位: 中国科学院声学研究所

地址: 北京市海淀区北四环西路21号大猷楼502室 邮政编码: 100190 电话: 010-82547901/2/3 传真: 010-82547903

京ICP备05042622号

本系统由北京勤云科技发展有限公司设计