

论著

双功能彩色多普勒超声评价高粘滞血症与颈动脉硬化闭塞症的关系

邹荣莉,李 莘,王雅琴

陕西省人民医院,陕西 西安 710068

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的:通过对高粘滞血症78例及对照组20例颈动脉的超声观察,探讨其与颈动脉硬化闭塞症(arteriosclerosis obliterans,ASO)的关系。方法:收集经血液流变学检测出的高粘滞血症78例及对照组20例,用双功能彩色多普勒超声仪观察颈动脉内径,IMT(血管内膜—中膜的厚度)斑块形成情况,管腔是否狭窄及其程度,并参考高粘滞血症分型标准分为4个亚型,结合B超结果进行分析。结果:高粘滞血症组中,IMT≥1.0mm,各种类型粥样硬化斑块的形成及二者所致的颈动脉狭窄的发病率均高于对照组,且IV型的腔梗发病率明显高于其它亚型。结论:对高粘滞血症患者行颈动脉双功能彩色多普勒超声检查,可以尽早发现ASO。

关键词 动脉硬化,闭塞性 超声检查,多普勒,彩色

分类号 R543.5 R445.1

DOI:

通讯作者:

作者个人主页: 邹荣莉;李 莘;王雅琴

本文信息

Supporting

PDF(1881K

[HTML全文

参考文献[PD

参考文献

服务与反馈

把本文推荐

加入我的书架

加入引用管理

引用本文

Email Alert

相关信息

本刊中 包含

的 相关文章

本文作者相关

邹荣莉

李 莘

王雅琴