

杨湘英, 徐雯. 脑卒中康复期患者下尿路症状发生情况及危险因素分析[J]. 中国康复医学杂志, 2012, (11): 1046-1048

脑卒中康复期患者下尿路症状发生情况及危险因素分析 [点此下载全文](#)

杨湘英 徐雯

浙江省杭州市第一人民医院康复医学科, 310006

基金项目:

DOI:

摘要点击次数: 118

全文下载次数: 90

摘要:

摘要 目的: 观察脑卒中康复期下尿路症状(LUTS)发生情况, 探讨影响其发生的危险因素, 为其预防提供依据。方法: 收集我科康复后出院1个月后的脑卒中患者121例, 采取Danis h前列腺症状评分问卷调查各类型LUTS发生情况。选取7个可能影响LUTS发生的因素, 按有、无下尿路症状分两组进行logistic回归分析, 确定与下尿路症状发生相关的危险因素。结果: 121例患者LUTS发生率56%。各类型症状频度的前三位依次为: 夜尿(42%)、尿急(39%)、日间尿频(34%)。各类型症状严重性依次为: 尿急、夜尿、日间尿频。在至少有一个症状的患者中, LUTS困扰发生率为81%; 使困扰发生的前三位症状依次为: 夜尿(29%)、尿急(26%)、日间尿频(21%)。Logistic回归模型筛选后显示下肢Brunnstrom运动功能分期1—3期、卒中以来有留置导尿史、服用镇痛药物是发生LUTS的独立危险因素。结论: 脑卒中康复期患者LUTS较为常见, 以储尿期排尿障碍为主。可从促进分离运动、严格掌握留置导尿指征、早期积极进行膀胱功能训练、避免服用镇痛药物等方面进行干预来控制LUTS的发生率。

关键词: [下尿路症状](#) [危险因素](#) [脑卒中](#) [康复](#)

[Download Fulltext](#)

Fund Project:

Abstract:

Keywords:

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

您是本站第 2255571 位访问者

版权所有: 中国康复医学会

主管单位: 卫生部 主办单位: 中国康复医学会

地址: 北京市和平街北口中日友好医院 邮政编码: 100029 电话: 010-64218095 传真: 010-64218095

本系统由北京勤云科技发展有限公司设计 京ICP备10000329号