

◎ 会员登录

用户名:

密码:

验证码:

DDZ84 看不清?换一张

◎ 快速通道

期刊摘要

> 您当前的位置:网站首页→期刊摘要

以任务导向性训练为主的家庭康复训练治疗脑卒中偏瘫出院患者的疗效观察 [点此下载全文](#)

郭丽云, 崔丽霞, 王潞萍

长治, 长治医学院附属和平医院康复科(郭丽云、崔丽霞、王潞萍、田泽丽、许霞), 神经内科(崔丽霞)

基金项目:

DOI:2012年10期

摘要点击次数: 29

全文下载次数: 34

摘要:

目的观察以任务导向性训练的家庭康复训练治疗脑卒中偏瘫出院患者的疗效。方法将经治疗出院的脑卒中偏瘫患者91例按随机数字表法分为家庭康复组(46例)和对照组(45例)。2组患者均给予预防脑血管病复发的常规口服药物治疗,对照组患者出院后进行一般家庭活动练习,家庭康复组则进行定期指导的家庭康复训练。家庭康复组2~4周末医院复诊1次,复诊时由其主管治疗师根据其功能水平制订家庭训练计划。家庭康复训练每日1次,每次30~60 min,持续6个月。2组患者均于出院时、出院3个月和出院6个月时进行偏瘫肢体运动功能(FMA)、日常生活活动(ADL)能力评价,并进行统计学分析比较。结果2组患者出院时偏瘫侧上、下肢FMA和MBI评分比较,差异无统计学意义($P>0.05$)。出院后3个月及6个月时,2组患者的上、下肢FMA和MBI评分较组内出院时均提高,差异有统计学意义($P<0.05$);家庭康复组出院3个月和6个月与对照组同期比较,家庭康复组上、下肢的FMA和MBI评分显著高于对照组($P<0.05$);家庭康复组出院6个月时的上、下肢FMA和MBI评分显著高于出院3个月时($P<0.05$),而对照组出院6个月时上、下肢FMA和MBI评分与出院3个月时组内比较无明显统计学意义($P>0.05$)。结论以任务导向性训练指导脑卒中偏瘫患者家庭康复,可促进患者偏瘫肢体运动功能和ADL能力的持续恢复。

关键词: 任务导向性训练; 脑卒中偏瘫; 家庭康复

[Download Fulltext](#)

Fund Project:

Abstract:

Keywords:

版权归《中华物理医学与康复杂志》编辑部所有

本站原创及转载的文章、资料,其版权均由本站及原作者或原刊载媒介所拥有;
未经版权所有人同意,任何机构或者个人不得擅自将其作为商业用途。

地址:武汉市解放大道1095号同济医院 邮编:430030

电话:(027)83662874 传真:83663264 E-mail:cjpmr@tjh.tjmu.edu.cn

本系统由武汉市凯思科技发展有限公司设计开发