

药物与临床

盐酸右美托咪啶对开胸手术患者麻醉苏醒期躁动的镇静作用

朱莉,张莉,余鸣

(湖北省肿瘤医院重症监护病房,武汉430079)

收稿日期 2011-12-17 修回日期 2012-1-16 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 研究盐酸右美托咪啶对开胸手术患者麻醉苏醒期躁动的镇静作用. 方法 全麻苏醒期躁动的开胸患者47例,给予盐酸右美托咪啶,用0.9%氯化钠注射液配制成 $4 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的浓度,20 min给予 $1.0 \mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ 的负荷量,之后使用微量泵以 $0.2\sim 0.7 \mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$ 的速度输注维持,维持Ramsay评分>3分,监测各项指标. 结果镇静效率为 $(87.5\pm 4.2)\%$,镇静时间内平均输注速度为 $(0.64\pm 0.12) \mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$,镇静前后平均动脉压(MAP)、呼吸率(RR)及心率(HR)明显下降,而中心静脉压(CVP)及血氧饱和度(SpO₂)无明显差异. 结论 盐酸右美托咪啶对开胸手术患者麻醉苏醒期躁动有较好的镇静作用.

关键词 [右美托咪啶,盐酸](#) [全麻苏醒期躁动](#) [镇静](#) [开胸手术](#)

分类号 [R971.2](#)

DOI: [10.3870/yydb.2012.07.019](#)

对应的英文版文章: [1004-0781\(2012\)07-0892-02](#)

通讯作者:

作者个人主页: 朱莉;张莉;余鸣

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(1077KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“右美托咪啶,盐酸”的相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [朱莉](#)

• [张莉](#)

• [余鸣](#)