

最新公告

二甲双胍联合甘精胰岛素治疗2型糖尿病30例观察

投稿时间： 2011-11-09 最后修改时间： 2012-01-20

DOI:

中文关键词: [二甲双胍](#) [甘精胰岛素](#) [2型糖尿病](#) [胰岛素抵抗](#)

英文关键词:

基金项目:

作者	单位
<a href="#">石瑾</a>	<a href="#">湖北省直属机关医院内科 (武汉 430071)</a>

摘要点击次数: 70

全文下载次数: 94

中文摘要:

摘要 目的: 探讨二甲双胍联合甘精胰岛素治疗2型糖尿病的疗效研究。方法: 56例体重指数(BMI) >24 kg·m<sup>2</sup> 的2型糖尿病患者随机分为两组, 对照组26例在饮食控制和体育锻炼基础上, 给予甘精胰岛素皮下注射; 观察组30例在对照组治疗基础上加服二甲双胍片0.85 g, po bid。治疗12周, 分别观察两组胰岛素用量、BMI、糖化血红蛋白(HbA1c)、空腹血糖(FPG)及餐后2 h血糖水平。结果: 与治疗前相比, 两组治疗后HbA1c、FPG及餐后2 h血糖均明显下降 (P<0.05), 两组胰岛素用量及治疗后BMI比较, 差异有统计学意义 (P<0.05); HbA1c稍有差异, 但无统计学意义 (P>0.05)。结论: 二甲双胍联合甘精胰岛素能较好的控制血糖达标, 有效改善代谢紊乱; 加用二甲双胍可明显减少甘精胰岛素用量, 改善胰岛素抵抗。

英文摘要:

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

[关闭](#)