

药物与临床

地奥司明片用于急性嵌顿痔围手术期46例

邓斌1, 徐飞1, 邱刚林1, 刘国保1, 陈培彦2

1.武汉市第八医院肛肠科, 430010; 2.湖北省应城市中医院, 432400

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的评价地奥司明用于急性嵌顿痔围手术期的临床效果。方法急性嵌顿痔患者95例, 随机分为治疗组46例和对照组49例。两组均不采用其他治疗痔病的药物及止血、改善微循环药物, 入院第3天骶麻下行痔疮外剥内扎术。治疗组于入院当天开始口服地奥司明片, 首次2.0 g, 以后每日2次, 每次1.0 g, 继续服药至术后第7天, 两组术前术后其他治疗方式相同。结果治疗组术后第7天发生疼痛、水肿、出血、局部炎症、坠胀感患者所占比例分别为13.04%, 6.52%, 15.22%, 23.91%, 13.04%, 对照组分别为63.27%, 79.59%, 59.18%, 77.55%, 65.31%, 两组比较均差异有统计学意义 ($P < 0.05$); 治疗组平均愈合时间 (19.8 ± 1.5) d, 对照组为 (32.9 ± 1.3) d, 治疗组医师和患者对疗效满意度分别为86.95%和84.78%, 耐受性满意度分别为95.65%和91.30%。结论地奥司明片辅助治疗急性嵌顿痔, 对减轻围手术期伤口疼痛、水肿、出血及肛门坠胀感等有明显的疗效, 损伤小, 可缩短病程。

关键词 [地奥司明](#); [嵌顿痔,急性](#); [围手术期](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2012\) 05-0613-02](#)

通讯作者:

作者个人主页: [邓斌1](#); [徐飞1](#); [邱刚林1](#); [刘国保1](#); [陈培彦2](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(1089KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\] \(0KB\)](#)

▶ [参考文献 \[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“地奥司明; 嵌顿痔,急性; 围手术期”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [邓斌](#)
- [徐飞](#)
- [邱刚林](#)
- [刘国保](#)
- [陈培彦](#)