

王学清, 王秀杰, 李岩. 香砂平胃散对小鼠胃排空的影响.
世界华人消化杂志 2003年 5月;11(5):571-574

香砂平胃散对小鼠胃排空的影响

王学清, 王秀杰, 李岩.

110004, 辽宁省沈阳市和平区三好街36号, 中国医科大学附属二院消化内科.

目的:研究香砂平胃散及其组成药物对胃排空功能的影响.方法:以葡聚糖蓝(BD)2 000为标记物,观察小鼠的胃内色素残留量.结果:香砂平胃散组[(39.5±18.3)%]及西沙必利组[(36.97±16.4)%]的胃残留率与对照组[(100.0±24.2)%]比较差异有显著性($P < 0.05$),两组之间无显著性差异($P > 0.05$).正交分析表明苍术、陈皮、木香、砂仁有促进胃排空作用,各味药物之间存在广泛的协同作用.厚朴、木香和砂仁的促胃排空作用与香砂平胃散无显著性差异($P > 0.05$).结论:香砂平胃散及其部分组成药物有促胃排空作用,苍术、木香、砂仁、陈皮起主要作用,各组成药物之间存在着广泛的一级交互作用.

世界胃肠病学杂志社, 北京百世登生物医学科技有限公司, 100023, 北京市2345信箱, 郎辛庄北路58号院怡寿园1066号

电话: 010-85381892

传真: 010-85381893

E-mail: wjg@wjgnet.com

http: //www. wjgnet. com

2004-2007年版权归世界胃肠病学杂志社和北京百世登生物医学科技有限公司

● 电子杂志
● 高影响力论文
● 友情链接
访问总次数

今日访问

当前在线