

马智群, 田芸, 付功莉, 吴晓红, 唐敏, 周克利, 王晓阳, 颜红, 刘涛, 谢娟. FCA量表在重型颅脑损伤患者康复治疗与护理效果评价中的应用[J]. 中国康复医学杂志, 2007, (2): 165-167

FCA量表在重型颅脑损伤患者康复治疗与护理效果评价中的应用 [点此下载全文](#)

[马智群](#) [田芸](#) [付功莉](#) [吴晓红](#) [唐敏](#) [周克利](#) [王晓阳](#) [颜红](#) [刘涛](#) [谢娟](#)

四川省乐山市人民医院护理部, 614000

基金项目:

DOI:

摘要点击次数: 85

全文下载次数: 122

摘要:

目的: 运用功能综合评定量表(FCA)评价重型颅脑损伤患者的综合功能, 比较早期、个体化、程序化的综合性康复治疗与护理与神经外科常规护理的效果。方法: 将51例重型颅脑损伤患者随机分为实验组(26例)和对照组(25例), 进行临床对照性研究, 两组均常规进行神经外科的手术治疗及药物治疗, 实验组在急性期患者生命体征平稳24h后即介入运动、营养、认知、心理、日常生活能力等个体化、程序化的综合性康复治疗与护理, 对照组执行神经外科护理常规。结果: FCA总评分, 实验组出院时为 $81.81 \pm 22.83$ , 对照组为 $64.06 \pm 25.81$ , 两组比较有显著性差异( $P < 0.05$ ); 实验组出院1个月后及出院3个月后分别为 $101.15 \pm 9.66$ 、 $106.68 \pm 4.03$ , 对照组为 $85.47 \pm 19.76$ 、 $93.18 \pm 18.04$ , 两组比较有极显著性差异( $P < 0.01$ ); 两组患者入院及出院时FCA分项评分比较, 实验组较对照组运动功能评分提高22.83%, 认知功能评分提高45.32%, 综合功能评分提高27.71%; 实验组综合功能的恢复优于对照组。结论: 重型颅脑损伤患者生命体征平稳24h后早期介入个体化、程序化的综合性康复治疗与护理对重型颅脑损伤患者运动、认知综合功能的恢复有良好的促进作用。

关键词: [重型颅脑损伤](#) [功能综合评定](#) [功能评价](#) [康复护理](#)

[Download Fulltext](#)

Fund Project:

Abstract:

Keywords:

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

您是本站第 275441 位访问者

版权所有: 中国康复医学会

主管单位: 卫生部 主办单位: 中国康复医学会

地址: 北京市和平街北口中日友好医院 邮政编码: 100029 电话: 010-64218095 传真: 010-64218095

本系统由北京勤云科技发展有限公司设计