

## 术前D二聚体水平可以预测 非小细胞肺癌患者术后1年内预后不良

Zhe WANG, Junke FU, Dongmei DIAO, Chengxue DANG

### 摘要

**背景与目的** 部分非小细胞肺癌 (non-small cell lung cancer, NSCLC) 患者术后短期即出现转移。D二聚体 (D-dimer, DD) 是肺癌 (主要是非手术) 患者的预后因素。本研究旨在探讨其能否预测NSCLC患者术后短期预后不良。方法 检测56例NSCLC患者的术前DD水平, 术后随访1年, 终点是出现预后不良事件 (转移、局部复发或肺癌相关性死亡)。统计分析组间不良预后对比情况。结果 以术前DD水平的中位数 (四分位间距) 1.05 (0.55) mg/L为分界值, 高DD组患者中出现预后不良事件11例, 而低DD组中出现预后不良事件3例, 两组相比具有统计学差异 ( $P=0.03$ ,  $OR=4.89$ ,  $95\%CI: 1.2-20.1$ )。高DD组与低DD组的疾病进展情况亦有统计学差异 ( $P=0.024$ )。术前DD对于早期NSCLC (I期、II期), 特别是早期腺癌术后短期预后不良的预测最为准确。结论 术前DD水平可以预测NSCLC患者术后1年内预后不良, 有助于筛选适合手术的患者。

DOI: 10.3779/j.issn.1009-3419.2011.06.10

### 关键词

肺肿瘤; D二聚体; 预后

全文: [PDF](#) [HTML](#)

[Get Permission](#)

[ADD THIS](#)

## ARTICLE TOOLS

-  [索引源数据](#)
-  [如何引证项目](#)
-  [查找参考文献](#)
-  [审查政策](#)
-  [Email this article \(Login required\)](#)

## RELATED ITEMS

-  [Related studies Databases Web search](#)
-  [Show all](#)

## ABOUT THE AUTHORS

Zhe WANG  
710061 西安, 西安交通大学第一附属医院胸外科 (王哲, 付军科), 肿瘤外科 (刁冬梅, 党诚学) (通讯作者: 王哲, E-mail: radishwang@yahoo.com)

Junke FU  
710061 西安, 西安交通大学第一附属医院胸外科 (王哲, 付军科), 肿瘤外科 (刁冬



梅, 党诚学) (通讯作者: 王哲, E-mail: radishwang@yahoo.c

*Dongmei DIAO*  
710061 西安, 西安交通大学第一附属医院胸外科 (王哲, 付军科), 肿瘤外科 (刁冬梅, 党诚学) (通讯作者: 王哲, E-mail: radishwang@yahoo.c