

## 人工全膝关节置换术后急性低血压的相关因素分析及护理对策(PDF)

《第三军医大学学报》[ISSN:1000-5404/CN:51-1095/R] 卷: 35 期数: 2013年第04期 页码: 363-365 栏目: 短篇论著 出版日期: 2013-02-28

Title: -

作者: [张玉梅](#); [何洁](#)  
第三军医大学新桥医院骨科

Author(s): -

关键词: [膝关节](#); [人工假体](#); [置换手术](#); [急性低血压](#); [危险因素](#); [护理对策](#)

Keywords: -

分类号: R473.6; R544.2

DOI: -

文献标识码: A

摘要: 目的 观察人工全膝关节置换术(total knee arthroplasty, TKA)后并发急性低血压的临床特点,分析其原因,探讨相应的预见性的护理对策。方法 回顾性分析了290例初次行TKA患者的临床资料、术后低血压的发生情况和相关因素,以明确导致术后急性低血压的原因,并提出相应的护理策略。结果 290例行TKA患者中32例并发术后急性低血压,发生率为11.03%。其中显性失血量(术中+术后8 h内)≥500 mL者术后低血压的发生率显著高于<500 mL者( $P<0.01$ ),≥60岁者高于<60岁者( $P<0.05$ ),有心血管系统病史者高于无心血管疾病者( $P<0.01$ ),腰硬联合麻醉患者高于腰麻患者( $P<0.05$ ),术中应用止血带的患者高于未使用者( $P<0.01$ )。结论 TKA术后的急性低血压具有骤然发生、极其凶险、术后4~8 h为高发时间窗的临床特点,其发生主要与失血量、年龄、有心血管系统病史、麻醉方式和术中有无使用止血带等因素有关。做好术前、术后评估、严密监测生命体征和病情变化等预见性的护理措施是早期发现、提前干预、大大降低抢救风险的关键。

Abstract: -

### 参考文献/REFERENCES

张玉梅,何洁.人工全膝关节置换术后急性低血压的相关因素分析及护理对策[J].第三军医大学学报,2013,35(4):363-365.

备注/Memo: -

更新日期/Last Update: 2013-02-25

### 导航/NAVIGATE

[本期目录/Table of Contents](#)

[下一篇/Next Article](#)

[上一篇/Previous Article](#)

### 工具/TOOLS

[引用本文的文章/References](#)

[下载 PDF/Download PDF\(559KB\)](#)

[立即打印本文/Print Now](#)

[推荐给朋友/Recommend](#)

[查看/发表评论/Comments](#)

### 统计/STATISTICS

[摘要浏览/Viewed](#) 102

[全文下载/Downloads](#) 53

[评论/Comments](#)

[RSS](#) [XML](#)