

是非题

1. 难免流产一旦确诊, 应尽早使胚胎及胎盘组织完全排出。
2. 停经、腹痛、阴道流血多患者, 性诊刮术, 刮出组织病检未见绒毛组织, 仅见蜕膜, 可以排除异位妊娠。

二. 填空题

1. 妊娠早期出血性疾病常见于_____、_____、_____。
2. 流产是指凡妊娠_____、胎儿体重_____而终止者, 早期流产发生于妊娠_____, 晚期流产发生在妊娠_____。
3. 流产发展的阶段可分为_____、_____、_____、_____。
4. 异位妊娠发生部位以_____最常见, 占95%左右。其中60%位于_____部位, 异位妊娠的结局为_____或_____。
5. 异位妊娠的主要症状为_____、_____及_____、_____, 应与_____、_____、_____、_____等相鉴别。
6. 宫外孕诊断最为简单可靠的方法为_____。

三. 名词解释:

- 1、稽留流产
- 2、习惯性流产; 3
- 3、异位妊娠;
4. 陈旧性宫外孕

四. 选择题:

1. 输卵管妊娠发病部位多见于:
 - A、输卵管峡部 B、输卵管壶腹部 C、输卵管伞端
 - D、输卵管间质部 E、输卵管峡部和壶腹部交界处
2. 30岁女性, 停经42天, 右下腹痛伴不规则阴道流血10+天, 刮出物送病检为子宫内膜蜕膜样改变, 最大可能诊断是:
 - A、功血 B、流产 C、子宫内膜炎 D、异位妊娠 E、月经期
3. 诊断异位妊娠破裂, 最简单可靠的方法是:
 - A、病史、腹部检查及阴道检查 B、后穹窿穿刺
 - C、尿妊娠试验 D、B超 E、诊断性诊刮
4. 习惯性晚期流产最常见的原因是:
 - A、孕卵发育异常 B、黄体功能不全 C、甲状腺功能不全 D、染色体异常 E、子宫颈内口松弛

5. 停经50天, 有早孕反应, 尿妊娠(-), 3天前开始少量阴道流血, 今早流血增多, 并腹痛加剧, 随时排出一块组织后

流血减少, 妇查: 阴道内少量血液, 宫口未开, 子宫前位, 稍大, 双附件(-), 其处理方案应首选: ()

A、立即清宫 B、催产素注射 C、观察无特殊处理

D、HCG测定 E、大量抗生素消炎

问题6-7

A、少量阴道流血 B、宫口闭 C、两者都有 D、两者都无

6不全流产 ()

7. 完全流产 ()

问题8-10

A、绒毛膜发育繁盛与蜕膜的联系较牢靠 B、胎盘已完全形成

C、两者均是 D、两者均不是

8. 妊娠11周时易发生不全流产, 其主要原因是:

9. 妊娠12周后, 流产可能为完全流产的主要原因是:

10. 妊娠8周以前流产, 可能是完全流产的主要原因是:

12. 关于流产的临床表现哪项错误:

A. 流产的主要症状是阴道流血和腹痛

B. 早期流产常先有阴道流血, 后有腹痛

C. 晚期流产常先有腹痛后有阴道流血

D. 妊娠8周前发生流产时由于绒毛膜未发育成熟, 易发生不全流产

E. 羊水检查发现胎儿染色体异常者应立即终止妊娠

13. 关于稽留流产, 下列哪项错误:

A. 应作凝血功能检查 B. 子宫小于12周者, 进行钳刮术

C. 术前5天用孕激素, 以提高子宫肌肉对催产素的敏感性

D. 凝血功能异常者, 给予相应处理, 待凝血功能改善后再行引产或刮宫

E. 子宫大于12周者, 用催产素促进宫腔内容物排出

14. 不全流产有活动性出血伴休克, 应如何处理:

A. 立即刮宫 B. 输液输血纠正休克 C. 一边纠正休克一边刮宫

D. 纠正输液及抗感染后刮宫 E. 肌注催产素, 促残留胚胎组织排出

15. 28岁女性, 3年未孕, 用促排卵药后停经50天, 近10天有呕吐、恶心不适, 近日出现少量阴道流血, 以下处理哪项错误:

A. 卧床休息 B. 必要时抗感染治疗 C. 破膜引产

D. 口服维生素E E. 注射黄体酮

五. 问答题:

1. 试述流产的临床类型及其特征。
2. 确诊异位妊娠可采用的辅助检查有哪些?
3. 流产与宫外孕如何鉴别?
4. 流产感染的治疗原则?

六. 病案分析:

1. 潘X, 女, 28岁, 已婚, 因停经62天, 阴道流血2天加重伴下腹痛6小时于2003年5月20日8Am就诊。患者末次月经2003年3月19日, 停经40+天, 有恶心、厌油, 2天前无诱因阴道少量流血, 量少于平时月经, 无腹痛, 未予重视。今日2Am突然阴道流血增多, 如平时月经量2倍, 伴下腹阵发性隐痛, 遂急来我院, 途中昏厥一次。既往体健, 月经规则, 孕3产2。

体查: T: 37°C, P: 110次/分, BP: 80/50mmHg, 神志尚清, 急性病容, 贫血貌, 双肺无异常, 心率110次/分, 余无异常, 腹平软, 无压痛, 肝脾未扪及, 脊柱四肢无畸形。

妇查(消毒下): 外阴大量血迹, 阴道内见多量的血液及血块, 宫颈着色, 光滑, 大小正常, 宫口松, 有血液自宫口流出, 宫体前位, 如孕40+天大小, 软, 活动, 无压痛, 双附件(-)。

请回答: 诊断、诊断依据及处理。

2. 刘X, 23岁, 孕3产0, 因停经46天, 左下腹隐痛2天, 加剧8小时, 于2003年3月10日11pm急诊入院。末次月经2003年1月22日, 停经后无明显早孕反应, 3月3日起有少量阴道流血, 近2天感下腹隐痛, 未引起注意, 3月10日3pm突感左下腹剧痛, 不能忍受, 在当地卫生所注射“阿托品”未缓解, 并伴有肛门坠胀, 心慌, 上厕所时晕倒一次, 遂于11pm急诊抬送入院。起病来无畏寒发热。

既往体健, 月经正常, 孕3产0人流2, 末次人流2002年9月, 术后阴道流血, 下腹隐痛20+天, 经抗炎治疗后出血停止。

查: T 37.2°C, P 120次/分, R 22次/分, BP 80/50mmHg, 急性病容, 面色苍白, 心肺正常。满腹压痛、反跳痛, 以左下腹为甚, 移动性浊音(+).

妇查: 外阴(-), 阴道内少量血液, 宫颈轻糜, 举痛明显, 后穹窿饱满, 宫体后倾, 稍大, 软, 压痛, 左附件增厚, 压痛明显, 右附件亦有压痛。

化验: Hb 68g/L, Wbc $9.6 \times 10^9/L$, N 0.75, L 0.25, pt $150 \times 10^9/L$, CO₂CP 16mmol/L。

请问: (1) 诊断是什么?

(2) 还需做什么辅助检查?

(3) 处理意见。

3. 刘X, 女, 28岁, 已婚, 因停经46天, 阴道不规则流血2天, 突起下腹痛4小时于2001年9月20日10Am就诊。患者LMP为2001年3月19日, 停经40+天, 有恶心、厌油, 2天前无诱因阴道少量流血, 量少于平时月经。无腹痛, 未予重视。今日6Am突然感到下腹阵剧列疼痛, 呈撕裂样痛, 同时伴有恶心、肛门坠胀感, 遂急来我院, 途中昏厥一次。既往体健。月经规则, 孕3产0人流3, 末次人流时间为2001年2月。

体查: T 37°C, P 110次/分, BP 80/50mmHg, 神志尚清, 急性病容, 贫血貌, 双肺无异常, 心率110次/分, 余无异常

。腹平软，全腹压痛、反跳痛，肝脾未扪及，移动性浊音阳性，脊柱四肢无畸形。

妇查（消毒下）：外阴有血迹，阴道见少量血液，宫颈着色，光滑，大小正常，有举痛，有血自宫口流出。宫体前位，稍大，软，活动，无压痛，右附件区增厚，有压痛，左侧附件（-）。

请回答下列问题：

1) 还需做何辅助检查？

2) 请给出诊断、诊断依据并提出处理意见。

4. 潘X，女，28岁，已婚，因停经62天，阴道流血2天加重伴下腹痛6小时于2001年5月20日8Am就诊。患者LMP3月19日，停经40+天，有恶心、厌油，2天前无诱因阴道少量流血，量少于平时月经。无腹痛，未予重视。今日2Am突然阴道流血增多，如平时月经量2倍，伴下腹阵发性胀痛，7Am阴道排出一肉样组织，阴道流血更多，顺大腿往下流，伴下腹隐痛，遂急来我院，途中昏厥一次。

既往体健。月经规则，孕3产0。

体查：T 37℃，P 110次/分，BP 80/50mmHg，神志尚清，急性病容，贫血貌，双肺无异常，心率110次/分，余无异常。

腹平软，无压痛，肝脾未扪及，脊柱四肢无畸形。

妇查（消毒下）：外阴大量血迹，阴道见多量血液及血块，宫颈着色，光滑，大小正常，宫口松，有血自宫口流出。宫体前位，孕40+天大小，软，活动，无压痛，双附件（-）。

请回答：诊断、诊断依据及处理。

[返回](#)