

药物与临床

头孢呋辛预防性用于剖宫产手术患者195例

潘夏燕

(温州市瓯海区第三人民医院妇产科, 325014)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 [摘要] 目的观察头孢呋辛预防性用于剖宫产手术患者的临床效果。方法剖宫产患者390例, 随机分治疗组及对照组各195例。治疗组给予头孢呋辛1.5 g加入0.9%氯化钠注射液500 mL, 手术前0.5~2 h静脉滴注, 手术后12~48 h内给予维持量; 对照组手术前、手术中未用头孢呋辛, 手术后回病房应用头孢呋辛1.5 g加入0.9%氯化钠注射液500 mL, 静脉滴注, bid, 连续3~5 d。结果两组产妇手术后发热、最高平均体温、退热时间、切口感染、切口甲级愈合比较均差异无显著性(均 $P>0.05$)。治疗组和对照组子宫复旧不良分别为2, 12例, 治疗组子宫复旧优于对照组($P<0.05$)。结论围手术期抗菌药物规范化预防使用安全、有效, 可操作性强, 值得临床推广。

关键词 [头孢呋辛](#); [剖宫产](#); [围手术期](#)

分类号 [R978](#); [R714.4](#)

DOI: 10.3870/yydb.2010.12.023

对应的英文版文章: [2010-12-1597](#)

通讯作者:

作者个人主页: 潘夏燕

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(1113KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“头孢呋辛; 剖宫产; 围手术期”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [潘夏燕](#)