

药物与临床

咪喹莫特乳膏治疗尖锐湿疣30例

陈兴平,曹育春,陈岚

华中科技大学同济医学院附属同济医院皮肤性病科, 武汉430030

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-8-27 接受日期

摘要 目的 评价5%咪喹莫特乳膏治疗外生殖器、肛周尖锐湿疣的临床疗效和安全性。方法采用严格双盲、随机、平行对照的临床试验方法,将符合入选标准的60例患者随机分为治疗组和对照组,每组30例,治疗组给予5%咪喹莫特乳膏,对照组给予2.5%氟尿嘧啶乳膏治疗。用法均为每周3次,分别于星期一、星期三、星期五给药,直至疣体完全消退,最多用药8周。比较两组疗效、复发率及不良反应发生率。结果治疗组总有效率92.31%,对照组总有效率89.29%,差异无显著性($P>0.05$);治疗组痊愈后无复发病例,对照组痊愈后复发率为42.86%,差异有显著性($P<0.05$);治疗组局部不良反应发生率为20.0%,对照组为40.0%,差异有显著性($P<0.05$)。结论5%咪喹莫特乳膏治疗尖锐湿疣疗效好,复发率低,局部不良反应少。

关键词 [咪喹莫特](#) [氟尿嘧啶](#) [尖锐湿疣](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781\(2005\)03-0209-02](#)

通讯作者:

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(1353KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“咪喹莫特”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [陈兴平](#)
 - [曹育春](#)
 - [陈岚](#)