

药物与临床

根据前驱症状施药能有效减轻复发性生殖器疱疹病情

邓云华,李皓,陈兴平

华中科技大学同济医学院附属同济医院皮肤科, 武汉430030

收稿日期 2006-4-14 修回日期 2006-7-9 网络版发布日期 2007-1-23 接受日期 2006-7-9

摘要 目的 探讨利用前驱症状的“警示”信号尽早使用国产法昔洛韦胶囊对复发性生殖器疱疹(RGH)临床疗效的影响。方法 将60例RGH患者随机分为试验组和对照组各30例。试验组患者于复发的前驱症状出现时经自行判断而尽早服用备用法昔洛韦胶囊,每次0.25 g, tid, 连用6 d, 皮损处外搽1%喷昔洛韦乳膏, 第2次复发时给药方法同前; 对照组患者于复发后立即复诊用药。记录两组患者复发皮损面积、复发间隔时间与皮损痊愈时间。结果试验组复发皮损面积较对照组显著缩小($P<0.01$), 试验组复发皮损痊愈时间较对照组显著缩短($P<0.01$), 两组2次复发后间隔时间差异无显著性。结论 利用RGH前驱症状的“警示”信号在复发的最早期及时使用有抗疱疹病毒药物的疗法能有效减轻RGH复发病情。

关键词 [喷昔洛韦](#); [生殖器疱疹](#); [复发性](#); [前驱症状](#); [复发病情](#)

分类号 [A](#)

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2007\) 02-0170-02](#)

通讯作者:

邓云华 dengyunhua@tjh.tjmu.edu.cn

作者个人主页: 邓云华;李皓;陈兴平

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (1119KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“喷昔洛韦; 生殖器疱疹,复发性; 前驱症状; 复发病情”的相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [邓云华](#)

• [李皓](#)

• [陈兴平](#)