

皮肤病性病用药专栏

阿维A对寻常型银屑病患者血浆内皮素水平的影响

连昕, 钱悦, 吴艳, 陈善娟, 林能兴

(华中科技大学同济医学院附属协和医院皮肤科, 武汉430022)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 [摘要] 目的探讨阿维A治疗寻常型银屑病的临床疗效和安全性, 及其对血浆内皮素水平的影响。方法寻常型银屑病患者48例, 给予阿维A 20~30 mg与餐同服, 至无新发皮疹、原皮疹基本消退时减量为10~20 mg继服, 共治疗12周。根据治疗前后患者的银屑病皮损面积及严重度指数(PASI)评分的改变评价疗效, 并用放射免疫法检测其血浆内皮素水平。结果治疗第8周时总有效率91.7%, 12周时为95.8%, 未发现严重不良反应。治疗前后血浆内皮素水平分别为(62.91±16.32)和(56.94±17.62) pg/mL⁻¹, 差异有显著性(P<0.05)。结论阿维A治疗寻常型银屑病有较好疗效, 不良反应小。治疗后血浆内皮素水平明显下降, 降低内皮素水平可能为其治疗机制之一。

关键词 [阿维A](#); [银屑病,寻常型](#); [内皮素](#)

分类号 [R986](#); [R758.63](#)

DOI: 10.3870/yydb.2010.12.012

对应的英文版文章:[2010-12-1569](#)

通讯作者:
林能兴

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(1142KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“阿维A; 银屑病,寻常型; 内皮素”的 相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

- [连昕](#)
- [钱悦](#)
- [吴艳](#)
- [陈善娟](#)