

药物研究

赛庚定治疗利培酮所致高催乳素血症31例

朱毅平,钱敏才

(浙江省湖州市第三人民医院精神科,313000)

收稿日期 2006-8-28 修回日期 网络版发布日期 2007-10-8 接受日期

摘要 目的 探讨赛庚定(CYP)治疗利培酮所致精神分裂症患者血清催乳素(PRL)升高的疗效及不良反应.方法 选择符合CCMD-3诊断标准,年龄18~40岁,首次发病住院的精神分裂症患者.入院患者单一服用利培酮,第3周末检测PRL,PRL \geq 26.8 ng·mL⁻¹者作为入组对象,共31例男性患者.入组当日即口服CYP 18 mg·d⁻¹,po,tid,持续2周.服CYP期间利培酮的剂量不变.第5周末检测PRL.实验期间有睡眠障碍者允许口服氯硝地西洋,剂量控制在4 mg·d⁻¹内,记录不良反应.结果 31例患者入组时PRL平均为(52.25 \pm 17.36) ng·mL⁻¹,治疗后PRL平均为(25.52 \pm 5.77) ng·mL⁻¹,差值平均为(26.96 \pm 16.90) ng·mL⁻¹,PRL比治疗前有明显的下降(P<0.01),且无明显的不良反应.结论 CYP治疗利培酮所致PRL升高安全有效.

关键词 [赛庚定](#) [利培酮](#) [精神分裂症](#) [血清催乳素](#)

分类号 [R971.4](#) [R749.3](#)

DOI:

对应的英文版文章:[261546](#)

通讯作者:

作者个人主页: 朱毅平;钱敏才

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(1285KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“赛庚定”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [朱毅平](#)

• [钱敏才](#)