



投稿



查稿



网上商城



考试



期刊



视频

医学新知

[在线投稿](#) [稿件查询](#) [期刊阅读](#)

搜索: Search

请输入您想要的信息

搜索

高级搜索

您当前位置: 首页 >> 医学新知 >> 护理文献

护理文献

亲情式护理对痔疮手术疗效的影响分析

发表时间: 2011-12-9 15:45:32 来源: 创新医学网医学编辑部推荐

刘梅珍,井晓峰,赵志强 作者单位: 河北省石家庄市中医院肛肠科

【关键词】 痔;治疗结果;护理

痔疮疾病是肛肠学科的主要疾病之一,后期多需手术治疗,但手术时容易损伤肛管上皮和肛门局部皮肤,术后伤口出血、疼痛、水肿,大便困难等并发症发生率较高,其预防、治疗多为药物或手术治疗,我们从护理学角度,采用亲情式护理提高痔疮手术疗效、减少了各种并发症的发生,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

我科2010年12月至2011年3月住院患者30例,其中男18例,女12例;年龄28~60岁,平均年龄37岁。病程6~30年,平均病程13.6年。

1.2 治疗方法

采用随机分配法分为A、B 2组,每组15例。同类疾病均由同一手术医生采取规范手术方式。A组术后施行常规护理,B组术后施行亲情式护理。

1.3 诊断及选择标准

(1)诊断标准:根据1992年中国肛肠病学会制定的关于痔疮疾病的诊断标准。(2)选择标准:①符合痔疮疾病诊断标准;②排除其他疾病;③符合手术指征者;④患者及家属要求手术治疗且能理解并愿意配合术后各项操作。

1.4 护理方法

A组:普通护理:日常护理操作,进行入院及术前术后宣教,进行日常护理流程。B组:亲情式护理:在普通护理的基础上以个体化、舒适化为原则,针对个体患者制定术前术后的医疗注意事项宣讲,术后专人负责,指导患者的饮食、活动、病情变化的处理措施的施行、坐浴、换药的有效方法及随时患者及家属的病情沟通等。其他处理:术后选用足量抗生素静脉滴注5~7 d,每天便后换药,伤口微波治疗。

1.5 疗效评价

参照国家中医药管理局中医病证诊断疗效标准[1]中关于痔疮疾病的疗效标准。观察2组术后伤口出血、伤口疼痛、伤口水肿、大便困难、伤口愈合时间,其中大便困难、术后疼痛指需药物治疗者。

1.6 统计学分析

快速导航

Navigation


- 在线投稿
- 投稿指南
- 绿色通道
- 特色专区
- 服务流程
- 常见问题
- 编辑中心
- 期刊阅读

期刊约稿

- 中国社区医师
- 吉林医学
- 中国医学工程
- 成都医学院学报
- 内蒙古中医药

推荐期刊

医学信息



Vol.22
2009 8

- 期刊介绍
- 在线阅读
- 在线订阅
- 在线投稿

云南省职称晋升政策

最新最快!

在线客服...

QQ留言 1254635326

QQ交谈 4006089123

545493140(重要)

400-6089-123 68590972

应用SPSS 11.0统计软件, 计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示, 采用t检验, 计数资料采用Fisher确切概率检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 疗效比较

B组患者病情痊愈优于A组 见表1。表1 术后疗效比较

2.2 愈合时间比较

A组术后愈合时间10~21 d, 平均(14.0±3.7) d, B组8~14 d, 平均(9.0±2.1) d, 2组比较差异有统计学意义($P < 0.01$)。

2.3 并发症比较

B组并发症发生率少于A组($P < 0.01$)。见表3。

3 讨论

痔疮疾病是发病率高的一类疾病, 手术治疗是目前痔疮疾病的主要治疗手段, 虽然医疗技术来讲痔疮手术难度并不高, 但由于术后受每天排便的影响, 手术后常需每天换药甚至每天数次换药, 加之由于肛门直肠部特殊的组织解剖结构和相对复杂的生理功能, 术后常发生一些特有的并发症, 如伤口疼痛、出血、小便困难、大便干结难解、创面感染、创面愈合缓慢、肛缘水肿等, 如何预防及治疗这些术后并发症, 是肛肠学科的重要课题[2]。由于医院陌生的环境设施、各种治疗、检查和管理制度等对于住院患者都是一种负性生活事件, 是一种较强的心理应激源, 患者对这些应激源往往产生不良反应, 进而出现一些心理反应, 如焦虑、恐惧和猜疑等, 导致患者对医疗、护理的依从性变差, 这些严重影响了患者术后伤口的愈合及术后生活质量, 影响治疗效果。针对这些问题, 虽然国内外有各种临床研究报道, 但主要以中西药综合治疗为主, 尚没有从护理学的角度出发对患者进行健康指导从而缓解心理焦虑恐惧来解决此类问题。我们近年在临床综合治疗的基础上, 从护理学角度出发, 采用亲情式护理, 为患者营造一个温馨、愉悦、正性的住院及手术、换药环境, 在住院过程中向患者及时、充分说明病情的现状及发展趋势, 说明治疗过程中的注意点, 使患者了解自身病情, 并注重患者的行为、饮食调节, 从而加强患者对治疗护理的依从性, 最大限度地减轻患者心理焦虑及恐惧, 最终降低术后并发症的发生几率及严重程度, 节约了医疗资源, 提高了患者手术、住院满意度及术后生活质量。

另外从病理生理学来讲, 痔疮手术因切口较多, 手术切除病变组织形成创面较大, 使肛管经常处于收缩状态, 排便时肛管扩张, 括约肌痉挛性收缩, 导致术后剧痛。术后创面渗出增加, 分泌物持续刺激使肛管括约肌持续痉挛引起剧痛。由于肛管内括约肌持续痉挛, 肛管内压力不同程度升高, 导致肛门局部静脉淋巴回流受阻, 容易导致肛门伤口水肿, 所以括约肌痉挛是痔疮疾病术后并发症发生率较高的原因之一, 在亲情式护理的指导下, 可以有效减少患者伤口渗出, 使伤口保持清洁, 从而可以缓解括约肌的痉挛状态, 减少并发症发生, 促进伤口愈合。

【参考文献】

- 1 国家中医药管理局主编·中医病症诊断疗效标准·南京: 南京大学出版社, 1994.132.
- 2 张东铭主编·盆底与肛门病学·第1版·贵阳: 贵州科技出版社, 2000.407.

最热点



考试宝典-高分练兵场




揭秘论文“低价”根源



医学编辑中心



邮箱投稿视频教程





创新医学网
www.yixue360.com

[关于我们](#) | [合作伙伴](#) | [特色服务](#) | [客户留言](#) | [免责声明](#) | [学术团队](#) | [学术动态](#) | [项目合作](#) | [招贤纳士](#) | [联系方式](#)

电话: 400-6089-123 029-68590970 68590971 68590972 68590973 传真: 029-68590977

服务邮箱: vip@yixue360.com QQ: 1254635326 (修稿) QQ: 545493140 (项目合作)

Copyright © 2007 - 2012 www.yixue360.com , All Rights Reserved 陕ICP备:08003669号



匿名交谈