



您当前的位置是: 首页 >> 资料库 >> 2006期 >> 第5期

痔疮患者术前两种肠道准备的效果比较

邱燕虹 胡丰良 许惠珊

(广州中医药大学第一附属医院肛肠科 普宁市妇幼保健院护理部 广东广州 广东广州 广东普宁)



资料库



浏览次数 238658

2007年		
第1期	第2期	第3期
第4期		
2006年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2005年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2004年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2003年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

[摘要] 将432例拟手术的痔疮患者按手术顺序随机分为两组, 每组216例, 单序号患者按常规清洁灌肠方法行肠道准备为对照组, 双序号患者按清洁灌肠结合开塞露行肠道准备为实验组。两组患者在术中有残留液例数及术后24 h内排便例数比较, 有显著性差异 ($P < 0.05$), 而术后排便平均天数两组差异不明显 ($P > 0.05$)。认为清洁灌肠结合开塞露塞肛较常规清洁灌肠法能明显减少术中直肠残留液及术后24 h内排便。

[关键词] 痔疮 肠道准备 灌肠液

[中国分类号] [文献标识码] [文章编号]

()

[Key words]

【关闭窗口】

2002年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2001年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2000年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

COPYRIGHT © 护理学报 地址：广州市广州大道北1838号 技术支持：网天科技

您是第 **298159** 位访客