



国际口腔医学杂志 » 2011, Vol. 38 » Issue (2): 197-199 DOI: 10.3969/j.issn.1673-5749.2011.02.019

[综述](#)[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)[◀◀ 前一篇](#) | [后一篇 ▶▶](#)

感染根管中产黑色素杆菌检测率的影响因素

漆正楠综述 唐子圣 刘正审校

上海交通大学医学院附属第九人民医院牙体牙髓病科；上海市口腔医学重点实验室 上海 200011

Influential factor of black-pigmented bacteria detection rate in infected root canal

QI Zheng-nan, TANG Zi-sheng, LIU Zheng.

Dept. of Conservative Dentistry and Endodontics, The Ninth People's Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200011, China; Shanghai Key Laboratory of Stomatology, Shanghai 200011, China

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(0\)](#)[相关文章\(0\)](#)[点击分布统计](#)[下载分布统计](#)

蜀ICP备09014039号

版权所有 © 《国际口腔医学杂志》编辑部

地址：四川成都人民南路三段14号 邮编：610041 电话：028-85502414 E-mail: gwyxkqyxfc@vip.163.com

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持：support@magtech.com.cn