

刘桂杰, 李学华, 王力, 李洪光, 刘志恒. 胰腺实性假乳头状瘤的临床特征及手术治疗.
世界华人消化杂志 2008年 10月;16(30):3457-3459

胰腺实性假乳头状瘤的临床特征及手术治疗

刘桂杰, 李学华, 王力, 李洪光, 刘志恒.

252000, 山东省聊城市, 山东省聊城市人民医院肝胆外科. zjulgj@163.com

目的: 总结胰腺实性假乳头状瘤(SPTP)的临床特点及手术治疗方法. 方法: 回顾性分析聊城市人民医院自2001-01/ 2008-04收治的11例SPTP患者的临床资料, 主要包括临床表现、B超及CT检查、手术方式、病理检查结果及出院后随访情况. 结果: 除2例患者表现为急性腹痛外其余患者均无特异性临床表现. 肿瘤多位于胰体尾部. B超检查表现为实性或囊实性低回声肿物; CT平扫表现为胰腺低密度肿物, 增强CT扫描则表现为肿瘤周边不均匀增强. 除1例患者外其余病例肿瘤标志物均正常. 11例患者均采用手术治疗且10例患者获得随访资料, 平均随访23.7 mo, 所有患者均未发现复发转移. 结论: SPTP是一种罕见的胰腺低度恶性肿瘤, 多发于青年女性, 手术治疗能取得良好的疗效.