

ITP与NP方案治疗晚期非小细胞肺癌的随机对照临床研究

Xi YAN, Mei HOU, Hongfeng GOU

摘要

目的 比较ITP(异环磷酰胺+吡喃阿霉素+顺铂)与NP(去甲长春花碱+顺铂)方案治疗晚期非小细胞肺癌的临床有效率和毒副作用.方法 100例不能手术或术后复发转移的III~IV期NSCLC患者随机分组,接受ITP或NP方案化疗2~3个周期后评价疗效.结果 ①ITP组有效率为51.1%,部分缓解率为46.8%;NP组有效率为50.9%,部分缓解率为49.1%,两组近期疗效比较无显著性差异($P > 0.05$).②ITP组III~IV度白细胞下降28例(59.6%),NP组20例(37.7%),两组比较有显著性差异($P < 0.05$);III~IV度消化道反应ITP组10例(21.3%),NP组12例(22.6%),两组比较无显著性差异($P > 0.05$).结论 ITP和NP方案是治疗晚期NSCLC较有效的方案,与ITP方案相比,NP方案疗效相似而血液学毒性较轻.

DOI: 10.3779/j.issn.1009-3419.2004.01.16

全文: [PDF](#)



ARTICLE TOOLS

- 索引源数据
- 如何引证项目
- 查找参考文献
- 审查政策
- Email this article
(Login required)

RELATED ITEMS

Related studies
Databases
Web search

Show all

ABOUT THE AUTHORS

Xi YAN

Mei HOU

Hongfeng GOU