

梅齐, 汪勇, 李睿, 陈元. 伊立替康联合顺铂治疗晚期食管癌27例.
世界华人消化杂志 2008年 7月;16(20):2300-2303

伊立替康联合顺铂治疗晚期食管癌27例

梅齐, 汪勇, 李睿, 陈元.

430030, 湖北省武汉市解放大道1095号, 华中科技大学同济医学院附属同济医院肿瘤中心. chenyan008@163.com

目的: 观察伊立替康联合顺铂方案(IP)和顺铂联合氟尿嘧啶(DF)方案治疗晚期食管癌的近期疗效及毒副反应. 方法: 收集我科2006-07/2007-11晚期食管癌患者59例病例资料, 比较在疗效和副反应间的差异. 其中治疗组27例, 采用IP方案, 对照组32例, 采用DF方案, 21 d为1周期. 在化疗期间均常规水化利尿, 完成至少2周期化疗后进行评价疗效. 结果: IP方案组与DF方案组有效率(44.4% vs 28.1%, $P < 0.05$)及控制率(81.5% vs 53.1%, $P < 0.05$)差异有显著性. 主要的毒副反应为恶心呕吐, IP方案组发生率为88.8%, DF方案组发生率为90.6%, 无统计学差异; 其次为骨髓抑制, IP方案组发生率为77.7%, DF方案组为46.8%, 差异有显著性($P < 0.05$); 再次为腹泻, IP方案组发生率为33.3%, DF方案组为9.4%, 差异有显著性($P < 0.05$). 结论: IP方案较DF方案治疗晚期食管癌增加疗效, 同时也增加了血液系统毒性和腹泻的发生率, 但副反应临床上患者尚可以耐受, 值得推广应用.

世界胃肠病学杂志社, 北京百世登生物医学科技有限公司, 100023, 北京市2345信箱, 郎辛庄北路58号院怡寿园1066号

电话: 010-85381892

传真: 010-85381893

E-mail: wjg@wjgnet.com

http: //www.wjgnet.com

2004-2007年版权归世界胃肠病学杂志社和北京百世登生物医学科技有限公司

● 电子杂志
● 高影响力论文
● 友情链接
访问总次数

今日访问

当前在线