

● 电子杂志
● 高影响力论文
● 友情链接
访问总次数

今日访问

当前在线

成建萍, 倪雪君, 周国雄, 丁晓凌, 张海峰, 于秀. 超声引导下射频消融治疗原发性肝癌46例.
世界华人消化杂志 2009年 5月;17(14):1412-1416

超声引导下射频消融治疗原发性肝癌46例

成建萍, 倪雪君, 周国雄, 丁晓凌, 张海峰, 于秀.

226001, 江苏省南通市西寺路20号, 南通大学附属医院超声科. lily0138@126.com

目的: 比较分析经皮射频消融术治疗原发性肝癌的疗效. 方法: 本院2003-03/2008-07收治肝癌患者46例, 共69个结节, 均经临床证实. 患者予经皮射频消融治疗并跟踪随访. 患者生存率以Kaplan-Meier模型及Log-rank检验进行单因素分析, 完全消融率和局部复发率的比较采用卡方检验. 结果: 射频术后, 直径<3 cm的肿瘤完全消融率93.61%, 局部复发率6.82%, 1、2、3年的生存率为87.10%、80.13%和61.92%; 直径≥3 cm的肿瘤完全消融率68.18%, 局部复发率27.27%, 1、2、3年的生存率为73.33%、53.33%和30.48%. 单个病灶的完全消融率90.00%, 局部复发率10.00%, 1、2、3年的生存率为90.00%、82.80%和63.98%; 多发病灶者, 完全消融率82.05%, 局部复发率15.38%, 1、2、3年的生存率为68.75%、50.00%和28.57%. Child-pugh A级组完全消融率87.93%, 局部复发率13.21%, 1、2、3年的生存率为86.40%、75.25%和54.99%; B-C级组完全消融率81.82%, 局部复发率22.22%, 1、2和3年的生存率为66.67%、53.33%和35.56%. 结论: 射频消融治疗肝癌的完全消融率和局部复发率与肿瘤的大小相关; 长期生存率和肿瘤的数目、大小、肝功能分级相关.

世界胃肠病学杂志社, 北京百世登生物医学科技有限公司, 100023, 北京市2345信箱, 郎辛庄北路58号院怡寿园1066号

电话: 010-85381892

传真: 010-85381893

E-mail: wjg@wjgnet.com

http: //www.wjgnet.com

2004-2007年版权归世界胃肠病学杂志社和北京百世登生物医学科技有限公司