

作者：潘锋 来源：科学时报 发布时间：2008-7-10 7:7:36

小字号

中字号

大字号

早期乳腺癌患者术后仍存复发风险

我国首个乳腺癌患者教育及随访项目启动

〔科学时报 潘锋 报道〕“对于乳腺癌患者来说，比罹患乳腺癌更为可怕的是术后乳腺癌复发。”中国抗癌协会乳腺癌专业委员会主任委员、上海复旦大学附属肿瘤医院乳腺外科主任邵志敏教授在近日举行的“瑞宁得媒体座谈会”上接受记者采访时说。

乳腺癌是发生在乳房腺上皮组织的恶性肿瘤，是女性最常见的恶性肿瘤之一，发病常与遗传等多种因素有关并在40~60岁之间、绝经期前后的妇女中发病率较高。

邵志敏强调，即使早期的乳腺癌患者仍存在术后复发的风险，尤其是在术后的1~3年。辅助内分泌治疗将有助于降低乳腺癌复发的风险，对于激素受体阳性的患者来说，辅助内分泌治疗的过程将长达5年甚至更长的时间。但目前很多患者认为，乳腺癌的治疗就是单纯手术，只要切得干净就不会复发，其实这是个误区。

专家介绍，乳腺癌是一种与患者体内的雌激素等密切相关的肿瘤，它的发生发展与体内雌激素水平及其代谢异常有关。在乳腺癌综合治疗方案中，辅助内分泌治疗已经成为一个非常重要的组成部分。内分泌治疗通过阻断或停止雌激素的产生，消除了促使肿瘤生长的刺激因素。根据目前全球规模最大、随访时间最长、数据最为成熟的乳腺癌辅助治疗临床试验ATAC 100个月的研究结果，乳腺癌患者术后应用瑞宁得进行辅助治疗，相比传统药物三苯氧胺可以更好地避免术后1~3年的复发高峰。相比三苯氧胺，瑞宁得能够进一步降低24%的复发风险，对侧新发乳腺癌的风险降低40%，远处转移的风险减少16%。

为帮助乳腺癌患者减少复发风险，坚持完成术后5年的内分泌治疗，中国首个乳腺癌患者教育及随访项目——“丽康项目”近日在上海启动。该项目由中国抗癌协会乳腺癌专业委员会及全国30家医院，携手总部位于英国的跨国制药企业阿斯利康共同开展，旨在向乳腺癌患者提供专业的疾病知识教育和支持，帮助她们树立正确的抗癌态度并积极配合治疗，提高疗效果，改善患者的生活质量。

阿斯利康中国高级副总裁吴浣苓表示，“丽康项目”将探索乳腺癌辅助治疗随访与护理的新模式，同时还专门为早期乳腺癌辅助治疗开发了电子随访系统，记录患者辅助治疗的实施情况；通过随访门诊、随访信、电话随访和短信等多元化的随访方式紧密跟踪患者治疗状态；通过提供内容丰富的患者教育资料，提升患者对治疗及随访重要性的认识。

邵志敏表示，在日常生活中，坚持科学的乳房保健、乳腺自我检查和定期接受医疗专业人员的检查是十分必要的。

发E-mail给：



打印 | 评论 | 论坛 | 博客

读后感言：

发表评论

英研究称胚胎扫描有助降低下一代患乳腺癌风险
早期诊断乳腺癌患者愈后寿命与常人无异
“他莫昔芬之父”折桂美国临床肿瘤学会年度大奖
研究显示：药物择泰有抗乳腺癌复发效果
研究发现维生素D有助抑制乳腺癌
研究表明：儿时吃母乳 成年后得乳腺癌风险低
研究显示：术前化疗可提高乳腺癌保乳手术成功率
美研究显示胎儿细胞可能有助于抗乳腺癌

上海高校特聘教授（东方学者）名单公布
08年工程和材料领域重点实验室评估结果公布
基金委公布“十一五”期间第二批12个重大项目指南
陈宜瑜：科学基金向帅才和将才倾斜
科学中国人2007年度人物揭晓
台湾“中研院”新院士出炉 李远哲兄弟三人皆院士
朱清时院士：“荣休”之际
科学家培育出体型膨胀1000倍大番茄