

论著

## 八峰氨基酸口服液对大鼠的致畸作用

周立国<sup>1</sup>, 向佳华<sup>2</sup>, 向富权<sup>2</sup>

<sup>11</sup> 同济医科大学药学院,湖北武汉 430030 ;<sup>21</sup> 鹤峰县八峰制药厂,湖北鹤峰 445800

收稿日期 1999-5-2 修回日期 1999-7-4 网络版发布日期:

**摘要** 目的:应用八峰氨基酸口服液对大鼠进行了传统致畸试验。观察本品是否引起母体毒性和胚胎毒性反应。方法:设8g/kg、4g/kg、2g/kg(相当临床的30、15、6倍)3个剂量组。浓鱼肝油为阳性对照物,自来水为阴性对照组。结果:高、中剂量组孕鼠体重增长明显高于阴性对照组,高、中、低剂量组的胎鼠体重也都高于阴性对照组。结论:八峰氨基酸口服液各剂量组对胎鼠有促进生长发育的作用,对孕鼠无母体毒性,无胚胎毒性和致畸作用。

**关键词** [八峰氨基酸口服液](#) [大白鼠](#) [致畸作用](#)

### Review;

### Abstract

### Keywords

DOI

通讯作者

#### 扩展功能

##### 本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(71k\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0k\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

##### 服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [Email Alert](#)

##### 相关信息

- ▶ [本刊中 包含“八峰氨基酸口服液”的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [周立国](#)
- [向佳华](#)
- [向富权](#)