



【字体: 大 中 小】

《柳叶刀》发表文章分析中国30年疾病负担变化趋势

日期: 2019年07月29日 14:22 来源: 科技部

近日, 中国疾病预防控制中心、美国华盛顿大学等单位联合开展研究, 系统分析了我国1990年至2017年疾病负担变化趋势。相关研究结果发表于国际顶尖期刊《柳叶刀》, 论文标题为“Mortality, morbidity and risk factors in China and its provinces, 1990—2017:a systematic analysis for the global burden of disease study 2017”。

研究结果显示, 2017年我国人群前五位主要死亡原因为中风、缺血性心脏病、肺癌、慢性阻塞性肺病(COPD)和肝癌, 而1990年为下呼吸道感染、新生儿疾病、中风、COPD和交通事故。尽管中风年龄标准化死亡率自1990年下降33.5%, 但其仍为影响我国人群寿命的“头号杀手”, 而缺血性心脏病、肺癌排名分别由1990年的第7、13位跃升至2017年的第2、3位, 其年龄标准化死亡率分别增加20.6%和28.2%。同时, 在排名前25位的疾病中, 与1990年相比, COPD、新生儿疾病、下呼吸道感染、自残、肝硬化、其他慢性肝病、先天性出生缺陷和溺水年龄标准化死亡率下降50%之多。研究还发现, 高血压、吸烟、高钠饮食、空气污染、高血糖、高胆固醇、高体重指数、谷物蔬果摄入不足和饮酒是位列前十的死亡危险因素。此外, 疾病分布存在地区差异, 东部、沿海地区与经济发达省份疾病负担较小。

该研究结果反映, 近30年我国与传染性、孕产妇、新生儿和营养状况相关的疾病负担呈大幅下降趋势, 而非传染性疾病导致的疫病负担日益凸显, 提示未来公共卫生政策应优先关注慢性疾病。

扫一扫在手机打开当前页

打印本页

关闭窗口



版权所有: 中华人民共和国科学技术部

地址: 北京市复兴路乙15号 | 邮编: 100862 | 联系我们 | 京ICP备05022684 | 网站标识码bm06000001