

王冬, 刘枫, 王闻雅, 屠振兴, 李兆申. 中国Helicobacter pylori 感染者血清抗Helicobacter pylori IgG 亚型的变化. 世界华人消化杂志 2004年 8月;12(8):1982-1983

中国Helicobacter pylori 感染者血清抗Helicobacter pylori IgG 亚型的变化

王冬, 刘枫, 王闻雅, 屠振兴, 李兆申.

200433, 上海市长海路174号, 中国人民解放军第二军医大学长海医院消化内科. zhsli@81890.net

目的: 探讨中国H pylori 感染者血清抗H pylori IgG 亚型的变化及其与H pylori相关疾病的关系. 方法: 采用ELISA法检测中国广西和上海地区证实为H pylori 感染者血清抗H pylori IgG 亚型的水平. 其中上海患者55例, 广西患者74例. 结果: 中国广西和上海感染H pylori 的患者血清中IgG 亚型IgG1和 IgG2, IgG3 和 IgG4的水平非常低, 上海和广西感染H pylori 的患者IgG 各亚型之间无显著差异. 在上海和广西十二指肠溃疡患者血清中IgG2水平显著高于非溃疡性消化不良患者(P<0.05); IgG1、IgG3 和 IgG4水平在消化性溃疡患者和非溃疡性消化不良患者之间无显著差异. 结论: 抗H pylori IgG2水平可能是H pylori 感染致十二指肠溃疡的预测因子.

● 电子杂志  
● 高影响力论文  
● 友情链接  
访问总次数

今日访问

当前在线

世界胃肠病学杂志社, 北京百世登生物医学科技有限公司, 100023, 北京市2345信箱, 郎辛庄北路58号院怡寿园1066号

电话: 010-85381892

传真: 010-85381893

E-mail: wjg@wjgnet.com

http: //www. wjgnet. com

2004-2007年版权归世界胃肠病学杂志社和北京百世登生物医学科技有限公司