

网站首页	政策法规	健康教育	养生保健	慢病管理	肿瘤疾病	消化疾病	妇产疾病	血液疾病	呼吸疾病	心脑血管			
心脑血管	神经疾病	儿科疾病	精神心理	皮肤性病	身体疾病	五官口腔	内科疾病	普通外科	临床手术	整形美容	外科其他	临床科室	医技科室
临床诊断	疾病症状	物理检查	化学检查	检验医学	急诊医学	预防医学	基础医学	护理医学	中医诊疗	中医特色	中医方剂	中药名录	中西结合
用药指导	中西药品	专科用药	临床用药	生物医药	医院查询	就医指南	制药企业	医药批发	医疗器械	医学资源	医学文献	Medicine	Disease
Health	Institutes	OnlineDrugs											

当前位置：[主页](#) > [中药名录](#) > 文章内容

高血压病人有哪些用药禁忌

作者：中华医学网 发布时间：2018-12-20 10:55 浏览：176次

在日常生活当中，有很多的人会出现高血压，在这种疾病出现之后，还会造成头晕头痛，这些严重的影响到身体健康，平时大家需要注意高血压的出现，而且，也要注意合理的进行服药，但是应该注意一些服药禁忌，不要盲目地使用降压药物，那么，高血压病人有哪些用药禁忌？

一、忌擅自乱用药物

降压药有许多种，作用也不完全一样。有些降压药对这一类型高血压有效，有些降压药对另一类型高血压有效。服药类型不对路，降压作用不能充分发挥，有时会误以为“降压药不灵”。高血压病人的药物治疗应在医生指导下进行，应按病情轻重和个体差异，分级治疗。

二、忌降压操之过急

有些人一旦发现高血压，恨不得立刻把血压降下来，随意加大药物剂量，很容易发生意外。短期内降压幅度最好不超过原血压的20%，血压降得太快或过低都会发生头晕、乏力，重的还可导致缺血性脑中风和心肌梗死。

三、忌单一用药

除轻型或刚发病的高血压外，尽量不要单一用药，要联合用药，复方治疗。其优点是产生协同作用，减少每种药物剂量，抵消副反应。

四、忌不测血压服药

有些病人平时不测血压，仅凭自我感觉服药。感觉无不适时少服一些，头晕不适就加大剂量。其实，自觉症状与病情轻重并不一定一致，血压过低也会出现头晕不适，继续服药很危险。正确的做法是，定时测量血压，及时调整剂量，维持巩固。

五、忌间断服降压药

有的病人用降压药时服时停，血压一高吃几片，血压一降，马上停药。这种间断服药，不仅不能使血压稳定，还可使病情发展。

六、忌无症状不服药

有些高血压患者平时无症状，测量血压时才发现血压高。用药后头昏、头痛不适，索性停药。久不服药，可使病情加重，血压再升高，导致心脑血管疾患发生。事实表明，无症状高血压危害不轻，一经发现，应在医生指导下坚持用药，使血压稳定在正常水平。

七、忌临睡前服降压药

热门标签

药品 整形 减肥 美容 心理 饮食
女性 男性 老人 子宫肌瘤 输卵管不通
漏斗胸 股骨头坏死 风湿 糖尿病 肾炎
癫痫 肝病 肝硬化腹水 甲亢 三叉神经痛
重症肌无力 脑瘫 帕金森 红斑狼疮
颈椎病 牙齿 怀孕 湿疹 硬皮病

最新文章

- 1 胖大海没病别喝 经常服伤脾胃5
- 2 吃中药禁忌多 辛辣生冷不能吃
- 3 小儿服用中药注意五大要点
- 4 熟地黄的服用禁忌 伤寒者不宜用
- 5 中医教你如何鉴别中药的真假
- 6 警惕！补药补过头会起反作用
- 7 中药与抗生素联用要注意的配伍禁忌
- 8 常用中药甘草的配伍禁忌
- 9 家庭常备药六神丸的服用禁忌
- 10 十类中药 准妈妈们要谨慎使用或禁用

临床发现，睡前服降压药易诱发脑血栓、心绞痛、心肌梗死。正确的方法是睡前2小时服药。

一旦患有高血压，不要立刻把血压降下来，而且不要随意加大药物的剂量，避免意外出现，同时日常生活当中，要注意一些药物的选择，不要乱服用药物，更不要操之过急，以免造成脑中风，心肌梗死，平时也要注意合理的进行调节身体

胖大海没病别喝 经常服	吃中药禁忌多 辛辣生冷	小儿服用中药注意五大	熟地黄的服用禁忌 伤寒
中医教你如何鉴别中药	警惕！补药补过头会起	中药与抗生素联用要注	常用中药甘草的配伍禁
家庭常备药六神丸的服	十类中药 准妈妈要谨	朱砂有小毒 含朱砂药物	吃补肾中药要注意哪些
把好三道用药关卡 减少	中医分析 服用中成药要	党参可以泡水喝吗 党参	中药禁忌 不同口服药送
中药泡酒有啥讲究 东南	服药有禁忌 哪些人不能	西洋参的禁忌有哪些 不	西洋参的副作用有哪些



本站部分资源来自互联网，如有任何问题请联系中华医学网！

感谢您对中华医学网的支持，请把本站推荐给您的好友，让医学传递你我他（她）！

邮箱： : huguohuawx@163.com 微信:13831408652 Copyright中华医学网