

用药指南

16例霍乱用药调查分析

张利国, 周颖, 周国民, 曾德仪, 罗仁勇

四川省内江市第二人民医院, 641003

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要

目的了解霍乱治疗中用药的合理性。方法采用回顾性调查方式, 查阅住院病历, 记录患者的基本情况、用药情况、病原学检查+药敏实验、药费及转归情况等。结果霍乱0139型5例, 霍乱病原菌携带者9例, 霍乱医学观察者2例, 均严格隔离, 及时补液, 辅以抗菌和对症治疗。无死亡病例。结论治疗霍乱用药基本合理。

关键词 [FONT-FAMILY: 宋体 mso-ascii-font-family: 'Times New Roman' mso-bidi-font-family: 'Times New Roman' mso-font-kerning: 1.0pt mso-ansi-language: EN-US mso-fareast-language: ZH-CN 霍乱 mso-bidi-language: AR-SA](#)>霍乱 [FONT-FAMILY: 'Times New Roman' mso-font-kerning: 1.0pt mso-ansi-language: EN-US mso-fareast-language: ZH-CN mso-bidi-language: AR-SA '\) "> mso-fareast-font-family: 宋体"> \[FONT-FAMILY: 宋体 mso-ascii-font-family: 'Times New Roman' mso-bidi-font-family: 'Times New Roman' mso-font-kerning: 1.0pt mso-ansi-language: EN-US mso-fareast-language: ZH-CN 用药情况 mso-bidi-language: AR-SA">用药情况 \\[FONT-FAMILY: 'Times New Roman' mso-font-kerning: 1.0pt mso-ansi-language: EN-US mso-fareast-language: ZH-CN mso-bidi-language: AR-SA '\\\) "> mso-fareast-font-family: 宋体"> \\\[FONT-FAMILY: 宋体 mso-ascii-font-family: 'Times New Roman' mso-bidi-font-family: 'Times New Roman' mso-font-kerning: 1.0pt mso-ansi-language: EN-US mso-fareast-language: ZH-CN 调查分析'\\\\) "> mso-bidi-language: AR-SA">调查分析\\\]\\\(#\\\)\\]\\(#\\)\]\(#\)](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2008\) 11-1413-02](#)

通讯作者:

作者个人主页:

张利国; 周颖; 周国民; 曾德仪; 罗仁勇

扩展功能	
本文信息	
▶	<a href="#">Supporting info</a>
▶	<a href="#">PDF (1280KB)</a>
▶	<a href="#">[HTML全文] (OKB)</a>
▶	<a href="#">参考文献 [PDF]</a>
▶	<a href="#">参考文献</a>
服务与反馈	
▶	<a href="#">把本文推荐给朋友</a> 霍乱; 用药情况; 调查分析” 几篇好文章, 特向您推荐。请点击下面的网址: "name="neirong">
▶	<a href="#">加入我的书架</a>
▶	<a href="#">加入引用管理器</a>
▶	<a href="#">引用本文</a>
▶	<a href="#">Email Alert</a>
▶	<a href="#">文章反馈</a>
▶	<a href="#">浏览反馈信息</a>
相关信息	
▶	<a href="#">本刊中 包含 “</a>
▶	<a href="#">本文作者相关文章</a>
•	<a href="#">张利国</a>
•	<a href="#">周颖</a>
•	<a href="#">周国民</a>
•	<a href="#">曾德仪</a>
•	<a href="#">罗仁勇</a>