

用药指南

84例痰涂片阳性肺结核患者耐药分析

张玉斌, 李琴

(武汉市武昌区疾病预防控制中心, 430061)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 [摘要] 目的了解武汉市武昌区肺结核耐药状况, 评价涂阳肺结核患者治疗管理效果。方法收集2008年3月1日~8月31日肺结核痰涂片阳性病例。初治肺结核患者治疗方案: 2HRZE/4HR或2H3R3Z3E3/2H3R3; 复治方案: 2SHRZE/1HRZE/5HRE或2S3H3R3Z3E3/1H3K3Z3E3/5H3R3。实行强化期医务人员为主, 家庭督导为辅的全程督导(DOTS), 继续期家庭督导为主, 医务人员管理为辅的患者管理模式。治疗5个月末送痰标本结核菌培养。按《全国结核病防治规划指南》进行疗效评价。结果可供检测患者84例, 其中初治肺结核64例, 复治肺结核20例。一线结核药物总耐药率33.3% (28/84); 耐多药率9.5% (8/84), 广泛耐药率2.4% (2/84), 氧氟沙星耐药率9.5% (8/84)。初治肺结核总耐药率21.9% (14/64); 耐多药率4.7%, 氧氟沙星耐药率1.6% (1/64), 广泛耐药复治肺结核总耐药率50.0% (10/20); 氧氟沙星耐药率35.0% (7/20)。复治肺结核来源: 综合医院20.0% (4/20); 结核病专科医院15.0% (3/20); 防治机构70.0% (14/20) 结论武昌区结核病耐药率和耐多药率高, 复治患者中氧氟沙星耐药率高; 复治肺结核产生的主要来源为结核病防治机构, 还需进一步加强DOTS策略的执行。耐药结核病是治疗失败的重要原因。

关键词 [抗结核药](#); [耐药](#); [肺结核](#)

分类号 [R978.3](#); [R521](#)

DOI: 10.3870/yydb.2009.09.049

对应的英文版文章: [2009-9-1218](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (404KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (OKB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“抗结核药; 耐药; 肺结核”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [张玉斌](#)

• [李琴](#)